


TELEOSTEI

Physoclisti

Ammodytiformes - Ammodytidae

Ammodytes cicerellus

RAFINESQUE



La cicerelle. *Ammodytes cicerellus*. (Catalogue des Poissons comestibles. L. JOUBIN et LE DANOIS Paris, 1925, page 35).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. — Corps allongé, subcylindrique, couvert de très petites écailles. Replis longitudinaux sur toute la paroi ventrale.

Une seule dorsale allongée ; anale allongée comme la dorsale, toutes deux pouvant s'effacer dans un sillon et n'ayant que des rayons articulés simples, courts et frêles.

Mâchoires inférieure proéminente. Pas de dents sur les mâchoires.

Ouverture branchiale grande. 7 ou 8 rayons branchiostèges. Pas de vessie natatoire. Un seul cœcum pylorique.

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES. — Corps subcylindrique, allongé, sans replis transverses sur les flancs.

La hauteur du corps est comprise de 11 fois 1/2 à 15 fois dans la longueur totale, celle-ci ne dépassant guère 15 centimètres.

Il n'y a pas d'écailles distinctes, sauf sur la partie postérieure du corps.

Coloration. — Bleu-verdâtre sur le dos, blanc argenté sur les flancs. Une tache noire apparaît fréquemment sur le sommet de la tête.

Tête. — Comprise de 4 fois 2/3 à 5 fois 3/4 dans la longueur du corps. Museau pointu, mandibule légèrement proéminente. Mâchoire supérieure (intermaxillaire) protractile. Pas de dents. Vomer inerme. Le diamètre des yeux est compris de 5 fois 1/2 à 6 fois 1/2 dans la longueur de la tête.

Nageoires. — Dorsale commence un peu en arrière de l'extrémité postérieure de la pectorale. Son bord supérieur est ondulé (trois ondulations), et non droit, comme dans *A. lanceolatus* et *A. tobianus*. Anale est également ondulée : les rayons simples et articulés étant plus élevés dans le voisinage des extrémités. Pectorales courtes. Caudale fourchue.

Rayons branchiostèges : VII.

Dorsale : 53-59. Anale : 28-30. Pectorales : 13-15.

Caudale : $x + I + 13 + I + X$.

Vertèbres : 68.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. BIOLOGIE. — Méditerranée. Plus rare en Atlantique (Shetland. Côtes de Norvège).

SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, OUVRAGES PRINCIPAUX

1810. — RAFINESQUE. In Caratt. d. alc. n. gén., p. 21, sp. 52, pl. 9, fig. 4 (*Ammodytes cicereus*).
1838. — KROYER. Dan. Fishes. III, p. 589 (*Ammodytes cicereus*).
1880. — MOREAU. Poissons France. III, p. 219 (*Ammodytes cicereus*).
1884. — DAY. British Fishes. I p. 333, p. 92, fig. 3 (*Ammodytes cicereus*).
1895. — SMITT. Scand. Fish. II, p. 573, fig. 136 (*Ammodytes cicereus*).
1810. — RISSO. Ichthyol. Nice, p. 95 (*Ammodytes tobianus*).
1870. — CANESTRINI. Faun. lat., pl. 51 (*Ammodytes tobianus*).
1862. — GUNTHER. Catalogue IV, p. 386 (*Ammodytes siculus*).
1869. — STEINDACHNER. Ichth. Span. u Port., p. 46, pl. 2, fig. 3 (*Ammodytes siculus*).

Jean LE GALL, 1933.