


TELEOSTEI

Atherinidæ

Atherina boyeri

(Risso)



DIAGNOSE — Corpo allungato, ricoperto di squame di mediocre grandezza ; l'altezza del tronco sta quasi 6 volte nella lunghezza totale del pesce. Il profilo del dorso forma una curva fino all'altezza della pettorale per poi proseguire quasi in linea retta.

Testa grossa e larga, la sua lunghezza sta 4 1/4 volte nella lunghezza del pesce. Muso corto, non appuntito. Bocca molto obliqua, poco protrattile, il suo squarcio sorpassa il margine anteriore dell'occhio. Mascelle fornite di dentini visibili posti anche sul vomere. Occhio molto grande elevato da toccare il profilo superiore della testa, il suo diametro sta 3 volte nella lunghezza della testa. Esso è molto maggiore dello spazio preorbitale e dello spazio interorbitale.

Linea laterale poco distinta, vi si contano 55 a 58 squame, in quella trasversale, 10 a 11.

La prima dorsale, più piccola che nell'*A. hepsetus*, ha origine circa a metà della lunghezza del pesce (esclusa la codale) conta sette esili raggi di cui il primo è metà lungo del secondo, gli altri vanno gradatamente scemando. Seconda dorsale più alta della prima, conta 13 raggi, il primo di questi è semplice, gli altri ramosi. Codale alquanto forcuta con 17 raggi. Anale opposta alla seconda dorsale ma molto più lunga, conta 14 raggi di cui il primo è semplice e corto. Ventrali poste a circa metà lunghezza delle pettorali, esse hanno 1 raggio spinoso e 5 di molli. Pettorali bene sviluppate e poste più verso il dorso, esse raggiungono quasi l'inserzione della prima dorsale e posseggono 15 raggi.

COLORAZIONE — Dorso grigio verde cosparso di punticini neri specialmente sulla regione della testa e del muso. Parti inferiori biancastre. Una fascia argentea molto larga scorre lungo i fianchi. Pezzi opercolari argentei.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA — Vive in tutto il Mediterraneo specialmente nei mari più caldi del medesimo. Nell'Oceano atlantico lo si trova fino alle coste dell'Inghilterra.

BIBLIOGRAFIA

1809. — DELAROCHE. Ann. Mus. XIII, pag. 357 (*Atherina hepsetus*, var 3 Cabanda).
1810. — RISSO. Ichth. Nice, pag. 338 (*Atherina Boyeri*).
1826. — RISSO. Hist. Nat., pag. 470 (*Atherina Boyeri*).
1830. — CUVIER VALENCIENNES. Hist. Poiss. X, pag. 432 (*Atherina Boyeri*).
1832. — BONAPARTE. Icon. Ital. 91 fasc. XVII (*Atherina Boyeri*).
1850. — GUICHENOT. Expl. Alger, pag. 66 (*Atherina Boyeri*).
1859. — GÜNTHER. Cat. Fish. III, pag. 394 (*Atherina Boyeri*).
1872. — CANESTRINI. Faun. Ital., pag. 116 (*Atherina Boyeri*).
1882. — MOREAU. Hist. Poiss. Fran. III, pag. 205 (*Atherina Boyeri*).
1912. — NINNI E. Cat. Pes. Adriat., pag. 126 (*Atherina Boyeri*).
1926. — DE BUEN F. Cat. Ichth. Medit. Espan., pag. 67 (*Atherina Boyeri*).

E. NINNI 1931.