



EXPLICATION DES FIGURES

Reproduction de la figure X des Mémoires de la Société Zoologique de France, vol. XXIII 1910. Toutes les figures se rapportent au mâle.

Fig. 1. Plaque épimérale du dernier segment du métasome $\times 22$. — Fig. 2. Antenne supérieure $\times 22$. — Fig. 3. Pédoncule et premiers articles du flagellum d'une antenne inférieure $\times 22$. — Fig. 4. Gnathopode antérieur $\times 22$. — Fig. 5. Gnathopode postérieur $\times 22$. — Fig. 6. Péréiopode de la 1^{re} paire $\times 22$. — Fig. 7. Péréiopode de la 3^e paire $\times 22$. — Fig. 8. Péréiopode de la 4^e paire $\times 22$. — Fig. 9. Péréiopode de la dernière paire $\times 22$. — Fig. 10. Uropode de la dernière paire $\times 30$. — Fig. 11. Telson $\times 30$. — Fig. 12. Ensemble de l'animal $\times 20$.

DIAGNOSE. — *Mâle.* — Corps robuste, modérément comprimé, long de 5 mm. Tête aussi longue que l'ensemble des premiers segments du mésosome, lobes latéraux peu saillants, arrondis. Plaques coxales I-IV un peu plus hautes que les segments correspondants. Plaques I-III présentant une petite dent à l'angle inféro-postérieur. Plaques épimérales III largement arrondies en arrière. Segment I de l'urosome présentant une dépression dorsale, suivie d'un renflement qui porte une paire de soies et une paire d'épines.

Yeux énormes, occupant presque toute la hauteur de la tête et contigus à son sommet. Antennes I courtes, n'atteignant pas l'extrémité du pédoncule des antennes II; premier article du pédoncule très volumineux, prolongé en avant, flagellum un peu plus court que le pédoncule, avec des calcéoles, flagellum accessoire biarticulé. Antennes II beaucoup plus longues que le corps, 4^e article du pédoncule beaucoup plus gros et plus long que le 5^e article, flagellum avec des caléoles.

Gnathopodes I courts et grêles, article basal courbé, dilaté à l'extrémité; propode ovale, moins long que le corps, dactyle crochu. Gnathopodes II robustes, deux fois aussi longs que les précédents; carpe presque aussi long que l'article basal, propode spatuliforme; tous ces articles avec de longues soies au bord postérieur. Péréiopodes V avec l'article méral très volumineux, beaucoup plus long que l'ensemble des articles suivants, avec de longues soies ciliées au bord antérieur et 2 longues épines au bord postérieur, carpe et propode très grêles, dactyle rudimentaire. Péréiopodes VI et VII d'égale taille, beaucoup plus long que les péréiopodes V, dactyle rudimentaire, péréiopodes VII avec l'article ischial prolongé en une dent aigüe.

Uropodes III avec la branche interne très courte, terminée par 3 épines, branche externe biarticulée, plus de deux fois aussi longue que le pédoncule, avec, au bord interne, une rangée de longues soies ciliées, 2^e article très grêle, aussi long que la branche interne. Telson plus long que large, entièrement fendu, chaque lobe avec 3 épines marginales et 7 épines distales.

Femelle. — Inconnue.

Habitat. — Golfe de Bône; sable; 10 mètres.

BIBLIOGRAPHIE

1911. — CHEVREUX. Campagne de la *Melita*. Les Amphipodes d'Algérie et de Tunisie. *Mém. Soc. zool. de France*, vol. XXIII, p. 184, fig. 6 du texte et pl. X, fig. I-II.

CHEVREUX - 1928