


TELEOSTEI

Berycoidei - Berycidae

Beryx splendens

LOWE 1833



L'animal réduit de moitié.

DIAGNOSE — Tête 3 fois $1/2$ à $3\ 3/4$, hauteur du corps 3 fois $1/3$ à $3\ 3/4$ dans la longueur totale (caudale comprise) ; D. IV, 13 à 15 ; A. IV, 26 à 29 ; V. 1, 10 à 13 ; P. 1, 16. Ligne latérale, 71 à 81. Dimensions : jusqu'à 50 cm. de longueur totale environ (caudale comprise).

Corps oblong, comprimé, pas très haut (moins élevé que celui de *B. decadactylus*) couvert d'écaillles cténoïdes, grandes et robustes mais moins que chez l'autre espèce. Elles possèdent également, mais moins prononcé, un sillon longitudinal à la face externe de la partie libre, le reste étant plutôt granuleux. Corpuscule perliforme sur leur face interne.

Tête analogue à celle de l'autre espèce, mais sa longueur égalant la hauteur du corps. Les nageoires, aux différences près dans le nombre des rayons, analogues aussi à celles de *B. decadactylus*. Coloration semblable mais un peu plus pâle.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Madeira, Canaries, Maroc (Rabat, F. de Buen), côte méridionale de l'Espagne (Cadix, Steindachner), Portugal (Cezimbra, Cascais) et côte septentrionale de l'Espagne (Santander, Lozano). Japon (Günther, 1878, Hilgendorf, 1879, *vide* Goode et Bean). Côte Atlantique des États-Unis (Cap Hatteras, Goode et Bean). À Lisbonne, tout comme *B. decadactylus*, cette espèce est apportée au marché de poisson, provenant de pêches effectuées dans le voisinage du Cap Espichel.

OUVRAGES PRINCIPAUX

1833. — LOWE, Characters of a new Genus *Leirus* and of several new species of Fishes from Madeira, *Proc. Zool. Soc. London*, I, 142; 1836, On some Fishes of Madeira, *Trans. Cambridge Philos. Soc.*, VI, 197 (non la figure) ; 1837, A Synopsis of the Fishes of Madeira, etc., *Trans. Zool. Soc. London*, II, 174 ; 1839, Supplement to Synopsis, etc., id., III, 2 ; 1843, A History of Fishes of Madeira, London, 47-54, pl. VIII.
1859. — GÜNTHER, *Cat. Fishes*, I, 16 ; 1878 Notes on a collection of Japanese Sea-fishes, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 5 S., I, 485 (*vide* Goode et Bean).
1867. — STEINDACHNER, *Ichthiol. Ber. Spannen u. Portugal etc.*, IV *Forts.*, *Sitzb. kk. Akad. Wissensch.*, Wien, I Abt., LVI, 604.
1879. — HILGENDORF, Einige Beiträge zur Ichthyol. Japan's, *Sitzb. Ges. Naturf. Freunde, Berlin*, 78 (*vide* Goode et Bean).
1895. — GOODE et BEAN, *Oceanic Ichthyol.*, 176, pl. 53.
1896. — JORDAN et EVERMANN, *Fishes North and Middle America*, I, 844, fig. 357.
1903. — JORDAN et FOWLER, A Review of the Berycoid Fishes of Japan, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, Washington, XXVI, 3.
1917. — OSÓRIO, Nota sobre algumas espécies de peixes que vivem no Atlântico Ocidental, *Arquivo da Univers. de Lisboa*, IV, 111.
1919. — LOZANO, Los peces de la fauna Ibérica, etc., *Trab. Mus. Nac. Ciencias Nat.*, Madrid, Ser. zool., n^{os} 39, 47.
1924. — ROULE, Description d'une forme nouvelle, etc., *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 73.
1926. — F. DE BUEN, *Cat. Ictiol. Mediterraneo Español. etc.*, *Result. Camp. Internac.*, Madrid, n^{os} 2, 123.

A. RAMALHO — 1929.