



DIAGNOSE. — Corps allongé, arrondi antérieurement, comprimé dans la région caudale. Hauteur du corps comprise 5 1/2 à 6 fois dans la longueur totale. Longueur jusqu'à 8 centimètres.

Tête un peu plus longue que large, comprise à peu près 5 fois dans la longueur totale. Profil supérieur de la tête arrondi, antérieur presque droit. Museau court. Bouche relativement grande, étendue jusqu'à la marge inférieure de l'œil. Mâchoire supérieure proéminente ; sur la mâchoire supérieure 40 à 60 dents, 25 à 40 sur l'inférieure, sur une seule rangée ; l'inférieure seule pourvue d'une forte canine crochue. Au-dessus ou immédiatement en arrière de la marge postérieure de l'œil un tentacule frangé, suivi par 5 à 6 petits filaments grêles. Diamètre de l'œil plus petit que l'espace préorbitaire, sans tentacules sourcilières. Petit tentacule sur la narine antérieure. Fente branchiale large ; 6 rayons branchiostèges. Commissure des lèvres dilatée en un lobe légèrement courbé en bas, d'une couleur rouge-orange.

Commencement de la dorsale plus rapproché de la marge postérieure de l'œil que celle-ci du bout du museau, en avant de la marge postérieure de l'opercule. Dorsale avec 12 à 13 rayons épineux, 16 à 18 rayons mous ; la partie épineuse en arrière est plus basse, c'est pourquoi elle forme une échancrure avec la portion molle. Dorsale se terminant sur le pédoncule caudal. Anale commençant en arrière de la fin des pectorales ; elle a 17 à 18 rayons. Caudale arrondie avec 12 rayons. Pectorales grandes avec 12 rayons. Ventrals jugulaires, courtes, avec 2 rayons.

Peau nue. Coloration généralement variable. Couleur gris-brunâtre avec des taches plus foncées. Généralement une série de taches blanches formant une espèce de bande continue sur les flancs. Gorge d'un gris-rougeâtre, ventre gris-bleuâtre. Dorsale gris clair avec des taches brunes. Anale d'un gris clair bordée de gris-rougeâtre et avec les pointes des rayons blanchâtres. Caudale gris-jaunâtre claire avec 3 à 5 séries verticales de points gris-rougeâtres. Pectorales grisâtres avec quelque point foncé. Ventrals d'un blanc jaunâtre.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Atlantique : très rare dans la Manche, au Sud jusqu'à Madeira ; Méditerranée : rare, fréquent en Liguria.

BIBLIOGRAPHIE

1837. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poissons, XI, p. 234, pl. 322.
1861. — GUNTHER. Cat. Fishes Brit. Mus., III, p. 222.
1862. — CANESTRINI. Arch. Zool. Anat., II, p. 99, pl. III, fig. 4.
1872. — CANESTRINI. Fauna Italia, Pesci, p. 183.
1880. — VINCIGUERRA. Ann. Mus. St. Nat. Genova, XV, p. 440.
1881. — MOREAU. Hist. Nat. Poissons France, II, p. 138.
1889-1893. — CARUS. Prodrömus Faunae Medit., II, p. 694.

SYNONYMIE

Blennius Montagui Flemming, *B. Artedii* C. V., *Ichthyocoris Montagui* Bp.

U. D'ANCONA, 1934.