



DIAGNOSE. — Corps allongé, plus arrondi antérieurement, comprimé dans la région caudale ; sa hauteur diminue graduellement de la tête au pédoncule caudal. Hauteur au niveau des pectorales comprise 4 à 5 fois dans la longueur totale. Longueur jusqu'à 30 centimètres.

Tête comprimée, courte ; sa hauteur un peu plus petite que sa longueur. Museau court. Profil antérieur du museau oblique, arrondi au-dessus des yeux, coupé par une échancrure profonde en arrière des tentacules. Bouche horizontale, étendue jusqu'à la marge antérieure de l'orbite ou même au delà. Lèvre supérieure bien développée. Mâchoires pourvues d'une série de 36 à 40 dents égales, serrées ; sur la mâchoire inférieure en arrière une seule petite dent crochue (canine). Narine antérieure en avant de la marge inférieure de l'œil, avec un court tentacule frangé ; narine postérieure, ronde, un peu plus en haut. Yeux ronds grands, latéraux, près de la marge supérieure de la tête ; leur diamètre fait à peu près $\frac{1}{4}$ de la longueur de la tête, un peu moins que l'espace préorbitaire, un peu plus que l'espace interorbitaire. Entre les deux sourcils une forte échancrure interorbitaire. Tentacules sourciliers au-dessus de la moitié postérieure de l'œil, plusieurs fois ramifiés, beaucoup plus longs que le diamètre de l'œil. Fente branchiale large. Membrane branchiostège assez large en arrière de l'opercule, avec un angle postérieur prononcé, se réunissant ventralement avec celle de l'autre côté ; 6 rayons branchiostèges.

Dorsale unique, non divisée, commençant au-dessus de la tête immédiatement en arrière du sillon nuchal. Distance de la marge postérieure de l'œil au premier rayon dorsale à peu près égale à la distance préorbitaire. Hauteur de la dorsale augmentant légèrement en arrière ; elle se termine arrondie au-dessus du pédoncule caudal ; dans sa partie antérieure elle est moins haute que la hauteur du corps, au-dessus du pédoncule caudal elle dépasse la hauteur de celui-ci. Elle a 12 à 14 rayons épineux, 17 à 20 rayons mous. Anale commençant immédiatement en arrière de la fin des pectorales, au-dessous des premiers rayons mous de la dorsale, moins haute que celle-ci, également arrondie au-dessous du pédoncule caudal ; elle a 21 à 22 rayons. Chez les mâles les deux premiers rayons de l'anale forment une espèce de papille. Caudale arrondie dépassant $\frac{1}{6}$ de la longueur totale, avec 12 à 13 rayons. Pectorales grandes, ovales, avec 14 à 15 rayons. Ventrales jugulaires, avec 2 à 3 rayons.

Ligne latérale courbe au-dessus des pectorales. Peau nue. Couleur du dos gris-brun rougeâtre avec 6 à 8 bandes transversales noires étendues sur la dorsale ; ventre gris-rougeâtre avec des taches ou bandes noires plus ou moins distinctes, généralement alternant avec les bandes dorsales. Cette coloration est très variable ; parfois il existe une bande longitudinale obscure, plus ou moins continue. Taches foncées au-dessus de la tête ; deux taches foncées au-dessus de la gorge. Sur la dorsale quelquefois une tache obscure ronde aux premiers rayons épineux ; pointe des rayons blanchâtres. Anale gris-jaunâtre ou rougeâtre, obscure à la marge ; pointes des rayons blanchâtres. Souvent une tache noire à la base des pectorales ; partie postérieure de la pectorale parfois rougeâtre.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Atlantique, côtes européennes et africaines ; Méditerranée ; commun.

SYNONYMIE. — *Blennius patuanus* Raf.

BIBLIOGRAPHIE

1836. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poissons, XI, p. 200.
1861. — GÜNTHER. Cat. Fishes Brit. Mus., III, p. 212.
1862. — CANESTRINI. Arch. Zool. Anat. Fisiol., II, p. 90, pl. II, fig. 1.
1872. — CANESTRINI. Fauna Italia, Pesci, p. 180.
1881. — MOREAU. Hist. Nat. Poissons France, II, p. 121.
1885. — FACCIOIÀ. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. VI, p. 308.
1927. — LEBOUR, Journ. Mar. Biol. Ass. Plymouth, p. 648.
1929. — DUNCKER u. MOHR. Fische der Nord u. Ostsee, XII, g. 93.

Umberto D'ANCONA, 1934.