



Fig. 1. — Mâle, d'après Cuvier et Valenciennes, pl. CCCXXIII.
Fig. 2. — Femelle, originale.

DIAGNOSE. — Corps allongé, comprimé surtout dans la région caudale. Hauteur comprise $4 \frac{1}{2}$ à $5 \frac{1}{2}$ fois dans la longueur totale. Longueur jusqu'à 11 centimètres.

Tête à peu près aussi haute que longue, sa longueur comprise $4 \frac{3}{4}$ à 5 fois dans la longueur totale. Chez le mâle elle est pourvue supérieurement d'une crête charnue, qui, de l'espace interorbitaire, s'étend jusque dans la région occipitale. Chez les mâles jeunes et chez les femelles cette crête est petite ou absente. Museau court. Fente buccale étendue jusqu'au dessous de l'œil. Sur la mâchoire supérieure 22 à 30 dents, 16 à 22 sur l'inférieure, sur une seule rangée ; canine crochue de la mâchoire inférieure beaucoup plus forte que celle de la mâchoire supérieure. Diamètre de l'œil compris à peu près 5 fois dans la longueur totale, plus petit que l'espace préorbitaire, plus grand que celui interorbitaire. Tentacule surciliaire très petit, plus petit que la moitié du diamètre de l'œil. Fente branchiale, large ; 6 rayons branchiostèges.

Commencement de la dorsale plus éloigné de la marge postérieure de l'œil que celle-ci du bout du museau. Dorsale non divisée, avec 12 rayons épineux et 21 à 23 rayons mous, de hauteur à peu près uniforme, unie à la caudale par une membrane ; elle fait $\frac{2}{3}$ de la hauteur du corps. Anale moins haute que la dorsale, avec 24 à 26 rayons. Caudale arrondie avec 19 rayons. Pectorales grandes, étendues jusqu'à l'anus ou même au delà, avec 14 rayons. Ventrales jugulaires, petites, avec 3 rayons.

Peau nue. Ligne latérale peu marquée, visible seulement au-dessus des pectorales.

Coloration du mâle brillante, jaune-verdâtre supérieurement, avec 6 à 7 bandes verticales bleuâtres étendues jusqu'aux flancs. Quelquefois des lignes d'un bleu-lilas bordant ces bandes. Ventre jaune-verdâtre plus clair avec des bandes et points blanc-bleuâtres. Tache ocellaire noirâtre cerclée de bleu en arrière de l'œil ; 2 bandes vert-noirâtres qui partent de la crête et passent l'une sur l'œil, l'autre sur la tache ocellaire, une troisième bande préorbitaire. Crête de la tête jaunâtre. Tache bleue verticale à la base de la pectorale ; une autre bande transversale en avant des ventrales. Colorations de la femelle moins brillante ; tache ocellaire noire cerclée de blanc lilas. Nageoires dorsale et anale verdâtres bordées de brun. Caudale verte avec, chez les mâles, une bordure rougeâtre. Pectorales d'un vert-jaunâtre et ventrales jaunâtres.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Atlantique : jusqu'au Golfe de Gascogne ; Méditerranée : commun.

BIBLIOGRAPHIE

1837. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poissons XI, p. 238, pl. 323.
1861. — GUNTHER. Cat. Fishes Brit. Mus. III, p. 221.
1862. — CANESTRINI. Arch. Zool. Anatomia, II, p. 97, pl. IV, fig. 4.
1872. — CANESTRINI. Fauna Italia, Pesci, p. 182.
1881. — MOREAU. Hist. Nat. Poissons France, II, p. 111, fig. 95.
1885. — FACCIOLA. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., VI, p. 302.
1889-1893. — CARUS. Prodrômus Faunae Medit., II, p. 697.

SYNONYMIE

Blennius galerita Lacep., *B. lepidus* Pall., *B. alauda* Nardo, *B. gonocephalus* Raf.,
B. graphicus Risso, *Ichthyocoris pavo* Bp.

U. D'ANCONA, 1934.