



DIAGNOSE. — Corps allongé, épais antérieurement, comprimé dans la région caudale. Hauteur comprise 4 1/2 à 5 1/2 fois dans la longueur totale. Longueur jusqu'à 19 centimètres.

Tête à peu près aussi longue que haute ; sa hauteur comprise 4 3/4 à 5 fois dans la longueur totale. Profil supérieur arrondi. Museau court. Bouche petite, étendue jusqu'à la marge antérieure de l'œil. 34 à 38 dents sur chaque mâchoire, sur une seule rangée ; une canine crochue sur la mâchoire inférieure, absente ou peu développée celle sur la mâchoire supérieure. Yeux près du profil supérieur de la tête ; leur diamètre compris à peu près 5 fois dans la longueur de la tête, plus petit que l'espace préorbitaire, à peu près double de l'espace interorbitaire. Tentacule surciliaire plus court que la moitié du diamètre de l'œil ramifié. Fente branchiale large ; 6 rayons branchiostèges.

Commencement de la dorsale séparé de la marge postérieure de l'œil d'une distance moindre que l'espace préorbitaire. Dorsale avec 12 à 13 rayons épineux, 19 à 22 mous, sans interruption, gardant la même hauteur jusqu'au commencement de la caudale, à laquelle elle est unie par une membrane. Anale moins haute, avec 22 à 24 rayons. Caudale arrondie avec 21 rayons. Pectorales avec 13 à 14 rayons, ne s'étendant pas jusqu'à l'anus. Ventrales jugulaires, courtes, avec 3 rayons.

Peau nue. Ligne latérale très marquée ; elle forme une grande courbure au-dessus de la pectorale.

Couleur variable ; brunâtre ou olivâtre avec des taches noirâtres. Dorsale jaunâtre, souvent avec une tache noire dans le premier espace interradiaire. Anale pourvue d'une bande noire marginale et les pointes des rayons blanchâtres. Toutes les nageoires pointillées de brun ; pectorale et caudale souvent aussi avec des points rougeâtres. Quelquefois pectorales jaunâtres avec des points rouges.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Méditerranée commun. Atlantique : au Nord jusqu'au Golfe de Gascogne, rarement dans la Manche ; au Sud le long des côtes africaines, Madeira.

BIBLIOGRAPHIE

1837. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poissons, XI, p. 214, pl. 320.
1861. — GUNTHER. Cat. Fishes Brit. Mus., III, p. 218.
1862. — CANESTRINI. Arch. Zool. Anat., II, p. 94, pl. II, fig. 3 ; pl. III, fig. 1.
1872. — CANESTRINI. Fauna Italia, Pesci, p. 181.
1880. — VINCIGUERRA. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, XV, p. 435.
1881. — MOREAU. Hist. Nat. Poissons France, II, p. 114.
1885. — FACCIOLÀ. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., VI, p. 321.
1889-1893. — CARUS. Prodrômus Faunae Medit. II, p. 692.

SYNONYMIE

Blennius pholis Risso, *B. palmicornis* C. V., *B. cornucervi* Risso, *B. parvicornis* C. V.,
B. fidelis Chier., *B. pholis* Spinola.

U. D'ANCONA, 1934.