



**DIAGNOSI.** — Corpo allungato, più arrotondato anteriormente, compresso nella regione codale. Altezza compresa circa 5 volte nella lunghezza. Lungo fino a 15 cm.

Capo corto, poco più lungo che largo. Profilo antero-superiore del capo arrotondato. Muso corto. Fenditura boccale estesa fino sotto l'occhio. 24-30 denti per ogni mascella, su una sola serie, un po' più numerosi quelli della superiore che quelli dell' inferiore, seguiti da un canino adunco, più grande degli altri, di uguale grandezza sulle due mascelle. Diametro dell' occhio  $4 \frac{1}{2}$ -5 volte nella lunghezza del capo, maggiore che lo spazio interorbitale. Tentacolo sopracigliare poco ramificato, più lungo che il diametro dell'occhio, inserito un po' avanti il diametro verticale di questo, talvolta quasi uguale alla lunghezza del capo. Tentacolo più piccolo sulla narice anteriore. Fenditura branchiale ampia; 6 raggi branchiostegi.

Dorsale con 12-14 raggi spinosi e 18-23 molli, di altezza uniforme dalla regione occipitale al peduncolo codale, sul quale termina arrotondata, senza interruzione tra la parte molle e la spinosa. Distanza dal margine posteriore dell'occhio all'inizio della dorsale parecchio maggiore che lo spazio preorbitale. Anale meno alta che la dorsale, con 23-25 raggi. Ano dietro l'estremità delle pettorali. Codale arrotondata, più lunga nei maschi nei quali è lunga quasi come l'altezza del corpo, con 23-27 raggi. Pettorali ovali con 13-15 raggi. Ventrali giugulari, sottili, con 3 raggi.

Pelle nuda. Linea laterale indistinta; talvolta visibile sopra le pettorali.

Colorazione variabile, per lo più grigio-rossastra, punteggiata di nero, con 7-8 fasce brune dirette dal dorso verso i fianchi. Gola più chiara con fasce. Capo bruno-rossastro con macchie brune. Dorsale grigiastro punteggiata di giallastro, con una macchia nera nel primo spazio interradiale, estesa talvolta fino al quarto raggio. Anale grigiastro rigata di bianco e di brunastro; punte dei raggi biancastre. Codale e pinne pari brunastre.

**DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA.** — Mediterraneo, non abbondante.

## BIBLIOGRAFIA

1837. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poissons, XI, p. 212, pl. 319.  
1861. — GUNTHER. Cat. Fishes Brit. Mus., III, p. 215.  
1862. — CANESTRINI. Arch. Zool. Anat., II, p. 96, Tav. IV, fig. 6.  
1872. — CANESTRINI. Fauna Italia, Pesci, p. 180.  
1880. — VINCIGUERRA. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, XV, p. 434.  
1881. — MOREAU. Hist. Nat. Poissons France, II, p. 125.  
1885. — FACCIOLA. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., VI, p. 314.  
1889-1893. — CARUS. Prodrum Faunae Medit., II, p. 692.

## SINONIMIA

*Blennius tentaculatus* Lacép., *B. cornutus* Risso, *B. brea* Risso, *B. punctulatus* Risso,  
*B. stellatus* Risso, *B. graphicus* Risso, *B. auritus* Pall., *B. vividus* Raf.

U. D'ANCONA, 1934.