



**DIAGNOSE.** — Corps allongé, épais antérieurement, comprimé dans la région caudale ; diminue graduellement de hauteur de la tête au pédoncule caudal. Hauteur comprise 5 à 6 fois dans la longueur totale. Long jusqu'à 12 centimètres.

Tête courte, large, moins haute que longue, comprimée supérieurement, de forme semblable à celle des *Trigla* ; sa longueur comprise 4-5 fois dans la longueur totale. Profil antérieur du museau droit, oblique, arrondi au-dessus des yeux ; profil supérieur droit. Museau court, large. Fente buccale horizontale, étendue jusqu'au niveau de la moitié de l'œil. Mâchoire supérieure proéminente. Lèvres grosses, charnues, sur chaque mâchoire une série de 20-24 dents petites, serrées, saillantes ; en arrière une dent éloignée, plus forte, crochue (canine), plus forte que celle de la mâchoire inférieure. Narine antérieure plus rapprochée de l'œil que du bout du museau, pourvue à la marge postérieure d'un tentacule frangé moins long que la moitié du diamètre de l'œil. Narine postérieure plus en haut, en avant de la marge antérieure de l'œil. Yeux ronds, grands, rapprochés du profil antéro-supérieur de la tête ; leur diamètre compris 4-5 fois dans la longueur de la tête ; moins long ou égal à l'espace préorbitaire, plus grand que l'espace interorbitaire concave. Sourcils relevés sans tentacules. Fente branchiale large. Membranes branchiostèges réunies au-dessous de la gorge ; elles forment un angle en arrière de l'opercule. 6 rayons branchiostèges.

Dorsale unique, divisée en deux parties par une forte échancrure entre sa partie épineuse et sa partie molle, avec 12 rayons épineux, 16-19 mous. Commencement de la dorsale au-dessus de la région operculaire à une distance de la marge postérieure de l'œil plus petite que celle qui sépare celle-ci du bout du museau. Fin de la dorsale sur le pédoncule caudal, un peu en avant du commencement de la caudale. Anale commençant au-dessous de l'échancrure de la dorsale, en arrière de la fin des pectorales ; elle se termine au-dessous de la fin de la dorsale ; elle a 18 rayons. Caudale arrondie, longue à peu près 1/6 de la longueur totale, avec 11-14 rayons. Pectorales grandes, longues à peu près 1/4 de la longueur totale, avec 12-14 rayons. Ventrals jugulaires avec 2-3 rayons courts et forts.

Peau nue. Ligne latérale distincte, courbe au-dessus des pectorales. Couleur brunâtre ou grisâtre ou jaunâtre, avec des taches ou des bandes obscures transversales. Ventre gris. Quelquefois une tache obscure entre les deux premiers rayons épineux de la dorsale. Anale plus claire avec des points obscurs et l'extrémité des rayons rouge (blanchâtres dans les exemplaires conservés). Pectorales avec des points foncés sur les rayons. Bandes noirâtres transversales sur la caudale.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.** — Atlantique : Madeira ; Méditerranée : Espagne, France, Italie, Adriatique, Algérie.

**SYNONYMIE.** — *Pholis laevis* Lowe, *Ph. trigloides* Lowe ; *Blennius macropteryx* Rüppel (juv.).

#### BIBLIOGRAPHIE

1836. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poissons, XI, p. 228.  
1832-41. — BONAPARTE. Iconogr. Fauna Ital., III.  
1861. — GÜNTHER. Cat. Fishes Brit. Mus., III, p. 227.  
1872. — CANESTRINI. Fauna Ital., Pesci, p. 184.  
1880. — VINCIGUERRA. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, XV, p. 430.  
1881. — MOREAU. Hist. Nat. Poissons France, II, p. 142.  
1883. — FACCIOLA. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., VI, p. 337.  
1889-93. — CARUS. Prodrômus Faunae Medit., II, p. 694.

Umberto D'ANGONA, 1934.