



Box salpa, d'après CUVIER

DIAGNOSE. — Corps ovale-oblong, peu comprimé latéralement, couvert d'écaillés très petites à bord postérieur pectiné. La hauteur du tronc est comprise 3 fois $1/2$ dans la longueur totale du poisson.

Tête petite ; son diamètre est contenu 5 fois dans la longueur totale. Museau arrondi, court, gros. Bouche petite, arrivant à peine au bord antérieur de l'œil. Mâchoire supérieure un peu plus longue que l'inférieure ; elle porte une seule rangée de dents aplaties, larges, tranchantes ; l'inférieure possède des dents triangulaires, larges, très pointues et dentelées au bord.

Narine antérieure placée à la moitié de la distance du bout du museau au bord antérieur de l'œil. Œil plutôt grand, arrondi ; son diamètre est compris quatre fois dans celui de la tête. Opercule grand, arrondi ; sur la joue il y a quatre rangées d'écaillés. Le limbe du préopercule est marqué de stries.

Ligne latérale bien distincte, elle suit celle du dos.

L'insertion de la dorsale est située au milieu des pectorales ; elle est basse et un peu plus haute que la dorsale molle. Son quatrième aiguillon est le plus élevé. Caudale large et bien fourchue, à base écailleuse ; sa longueur est comprise 5 fois $1/2$ dans la longueur totale du poisson. L'insertion de l'anale a lieu entre le quatrième et le cinquième rayon de la dorsale molle ; son second aiguillon est le plus fort et le plus long. Ventrals sous l'insertion de la dorsale, elles sont aussi longues que les pectorales et insérées à moitié longueur des pectorales.

D. 11-14 ; A. 3-14 ; C. 3-18 ; P. 15 ; V. 1-5 ; L. 1 70-80 ; tr. 22.

Coloration. — Parties supérieures gris-bleuâtre ; côtés et parties inférieures blanc-argenté. Sur les côtés il y a dix étroites bandes longitudinales orangées, dorées, de même sur la tête. La tête est supérieurement verdâtre ; les opercules sont blancs. L'iris est jaune-doré. Les nageoires sont uniformément grises, exception faite de la partie supérieure des pectorales qui est tachetée de noirâtre.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Cette espèce est commune dans toute la Méditerranée ; rare sur les côtes françaises de l'Océan Atlantique. Plus commune aux Iles Canaries et dans la Mer des Açores.

BIBLIOGRAPHIE

1554. — RONDELET, L. V. C. 23, pag. 154. *Salpa*.
1686. — WILLUGHBY, pag. 316, T. V. 7. *Salpa*.
1766. — LINNÉ, pag. 470, sp. 15. *Sparus salpa*.
1768. — BRUNN. Icht. Massil., pag. 46. *Sparus salpa*.
1820. — RAFINESQUE. Car. An. Sicil., pag. 24. *Sparus salpa*.
1820. — RISSO. Icht. Nizza, pag. 243. *Sparus salpa*.
1826. — RISSO. Hist. Eur. Merid., pag. 349. *Box salpa*.
1830. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Poiss. VI, pag. 357. *Box salpa*.
1850. — GUICHENOT. Expl. Alg., pag. 54. *Box salpa*.
1859. — GÜNTHER. Cat. Fish. I, pag. 420. *Box salpa*.
1872. — CANESTRINI. Fau. Ital. Pesci, pag. 87. *Box salpa*.
1881. — MOREAU. Hist. Nat. Poiss. Fran. III, pag. 17. *Box salpa*.
1891. — DÖDERLEIN. Man. Itt. Med. V, pag. 224. *Box salpa*.
1912. — NINNI E. Cat. Pes. Adriat., pag. 34. *Box salpa*.
1926. — DE BUEN F. Cat. Ict. Medit. Esp., pag. 142. *Box salpa*.

E. NINNI, 1933.