



EXPLICATION DE LA PLANCHE

- Fig. 1. Adulte mâle (réduit d'un tiers).
Fig. 2. Adulte femelle (réduit d'un tiers). (Ces deux dessins d'après Le Danois).
Fig. 3. Ecaille épineuse très grossie.
Fig. 4. Museau protractile figuré en extension. Ar, articulaire; D, dentaire; Mx, maxillaire; Pmx, prémaxillaire.

DIAGNOSE — Corps ovale, court, fortement comprimé sur les flancs. Epaisseur du tronc faisant $1/4$ à $1/5$ de la hauteur maxima; celle-ci contenue un peu plus de deux fois dans la longueur totale. Ecailles petites, ovales, garnies de longues soies épineuses (fig. 3) qui donnent à la peau une consistance rude. Tête également recouverte de pareilles écailles. Museau étroit, arrondi, *excessivement protractile* (fig. 4). Dents en velours sur les mâchoires et le vomer. Yeux très grands, arrondis. Diamètre orbitaire à peu près égal à la distance préorbitaire. Ligne latérale peu visible. Deux dorsales dont la première entièrement épineuse. Anale en partie épineuse. Caudale carrée ou légèrement arrondie. Pelviennes thoraciques et pourvues d'un fort aiguillon barbelé à leur bord antérieur.

Dorsales IX à X — 23 à 24, Anale III/23, Caudale 18, Pectorales 14, Pelviennes I/5. Rayons branchiostèges 5, Vertèbres.

Coloration rougeâtre; le mâle (fig. 1) présente un certain nombre de bandes transversales foncées.

Taille : jusqu'à 16 centimètres.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Assez commun dans la Méditerranée; très rare dans l'Atlantique Nord et dans la Manche.

BIOLOGIE — Animal de profondeur; se nourrit de mollusques et de crustacés.

BIBLIOGRAPHIE

1758. — LINNÉ. Systema naturæ, éd. 10, p. 267. (*Zeus aper*).
1802. — LACÉPÈDE. Hist. nat. des poissons, IV. p. 591.
1810. — RISSO. Ichthyologie de Nice, p. 305.
1826. — RISSO. Hist. nat. de l'Europe méridionale, III, p. 270.
1835. — CUVIER ET VALENCIENNES. Hist. nat. des poissons, X, p. 30.
1860. — GÜNTHER. Catalogue of the fishes in British Museum, II, p. 495.

L. BERTIN 1930.