



DIAGNOSE — Coquille ovale, subtrigone ou subrhomboïdale, renflée, équivalve, inéquilatérale, à côté antérieur plus petit, arrondi et côté postérieur plus grand, obscurément tronqué. Sommets saillants, un peu antérieurs.

Test solide orné de vingt-six côtes rayonnantes obtuses, plus larges que leurs intervalles, et de cordons concentriques formant des granulations allongées et peu saillantes.

Surface mate, chagrinée par la rencontre de nombreuses lignes d'accroissement onduleuses et de stries rayonnantes très fines. Epiderme mince fibreux, gris jaunâtre, ne persistant que près des bords.

Coloration externe, ordinairement d'un blanc grisâtre : dans le jeune âge, elle est assez variable, rosée ou jaunâtre, avec des taches brunes semées sur les côtes.

Ligament externe, court, saillant.

Charnière : dans la valve gauche, deux petites dents cardinales divergentes, une dent latérale antérieure et une dent latérale postérieure ; dans la valve droite : deux petites dents cardinales divergentes, deux dents latérales antérieures et deux dents latérales postérieures.

Intérieur des valves blanc, maculé de brun foncé du côté postérieur ; bord fortement crénelé.

Diamètre umbono-ventral : 25 à 35 millimètres ; diamètre antéro-postérieur : 30 à 45 millimètres ; épaisseur : 20 à 25 millimètres.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Manche, Atlantique, Méditerranée : espèce essentiellement littorale, dont l'habitat en profondeur ne dépasse pas une vingtaine de mètres.

Dans la Méditerranée, le *C. edule* typique est remplacé par la variété *Lamarcki* Reeve plus oblique, plus mince, colorée de violacé ou de jaune-verdâtre, très inéquilatérale, à région antérieure arrondie, à région postérieure beaucoup plus développée, comprimée et rostrée.

Noms vulgaires : Bucarde, Coque, Rigadeau, Sourdou, Maillot, Hénon.

**BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE,
OUVRAGES PRINCIPAUX**

1758. — LINNÉ, Systema Naturæ, ed. X, p. 681 (*Cardium edule*).
1782. — CHEMNITZ, Conchylien Cabinet, VI, p. 141, vign. fig. C, p. 198, pl. 19, fig. 194 (*Cardium vulgare*) et p. 201, pl. 19, fig. 197 (*C. rusticum* [non L.]).
1844. — REEVE, Conchologia Iconica, II, *Cardium*, pl. IV, fig. 22 (*C. edule* L.) et pl. XVIII, fig. 93 (*C. Lamarcki*).
1870. — HIDALGO, Moluscos marinos de España, p. 150, pl. 39, fig. 2 - 5 (*C. edule* L.)
1892. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, Mollusques marins du Roussillon, II, p. 284, pl. XLVI, fig. 1 - 4 (*C. edule* L.) et pl. XLVII, fig. 8 - 10 (var. *Lamarcki* Rve.).
1897. — DAUTZENBERG, Atlas de poche des Coquilles des côtes de France, pl. 45, fig. 150 (*C. edule* L.) et 151 (var. *Lamarcki* Rve.).

ED. LAMY 1930.