



**DIAGNOSE.** — Corps oval-oblong, très comprimé latéralement, couvert d'écailles de moyenne grandeur, ainsi que les opercules. La hauteur du tronc est contenue 2 fois 1/2 à 2 fois 3/4 dans la longueur totale du poisson. Le profil supérieur de la tête est très arqué ; son diamètre est contenu 1 fois 1/2 dans la longueur totale du poisson. Museau allongé, pointu, d'où son nom spécifique de « *puntazzo* ».

La fente de la bouche est petite ; elle n'arrive pas à la moitié de la distance du bout du museau au bord antérieur de l'œil. Lèvres peu grosses.

Les mâchoires sont égales ; toutes deux sont fournies de huit dents dirigées en avant, longues, tranchantes avec leur base aplatie ; après ces dents suivent des molaires très petites disposées en une seule rangée.

L'œil est arrondi, de moyenne grandeur, rapproché du bord supérieur de la tête. Son diamètre est compris 4 fois dans celui de la tête. Les narines sont placées près de l'œil.

Préopercule arrondi postérieurement ; l'opercule terminé en pointe. Ligne latérale bien marquée et suivant la ligne du dos. La dorsale est plutôt basse mais plus haute que la dorsale molle ; le troisième aiguillon est le plus haut ; la base de la dorsale molle est écailleuse. Anale basse, son insertion est située sous celle de la dorsale molle, le second aiguillon est le plus fort et le plus long. Caudale échancrée, très ample, sa longueur est comprise 4 à 4 fois 3/4 dans la longueur totale du poisson. Les pectorales sont pointues, longues, mais elles n'arrivent pas jusqu'à l'orifice anal. Ventrale arrive jusqu'à l'anus.

**Coloration.** — Teinte générale du poisson grise, quelquefois verdâtre sur le dos, avec les côtés et les parties inférieures argentées. Le corps est traversé par sept à neuf ou dix bandes verticales noirâtres ou brunes. Sur le pédoncule caudal existe une large bande de forme quadrangulaire, noirâtre. Sur les côtés du corps inférieur existent des bandes longitudinales dorées plus ou moins visibles selon la fraîcheur du poisson. La dorsale est grise, la caudale a son bord libre pourvu d'une marge noirâtre ; les pectorales ont leur base noirâtre.

D. 11-13-14 ; A. 3-12 ; C. 19 ; P. 15 ; V. 1-5.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.** — Ce poisson vit en toute la Méditerranée y compris la Mer Noire, mais peu fréquente, exception faite pour Nice. Il se trouve aussi sur les côtes française de l'Océan Atlantique et aux Iles Canaries.

#### BIBLIOGRAPHIE

1774. — CETTI. Stor. Nat. Sardegna, pag. 115. *Puntazzo*.  
1809. — DELAROCHE. An. Mus. T. XIII. *Sparus acutirostris*.  
1820. — RISSO. Ich. Nizza, pag. 237. *Puntazzo*.  
1826. — RISSO. Hist. Nat. Eur. Merid., pag. 352. *Charax acutirostris*.  
1830. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Pois. VI, pag. 72. *Charax acutirostris*.  
1850. — GUICHENOT. Exp. Alg., pag. 48. *Charax acutirostris*.  
1859. — GÜNTHER. Cat. Fish. I, pag. 453. *Charax acutirostris*.  
1872. — CANESTRINI. Fauna Ital., pag. 89. *Charax acutirostris*.  
1881. — MOREAU. Poissons Fran. III, pag. 11. *Charax acutirostris*.  
1912. — NINNI E. Cat. Pes. Adriat., pag. 38. *Charax acutirostris*.  
1926. — DE BUEN F. Cat. Ict. Medit. Espan., pag. 146. *Charax acutirostris*.

E. NINNI, 1933.