



**DIAGNOSE** — Coquille régulièrement arrondie, assez mince, auriculée, presque équilatérale, subéquivalve.

Valve gauche légèrement bombée, ornée d'une vingtaine de côtes rayonnantes arrondies, à peine plus larges que les intervalles qui les séparent ; oreillettes subégales, la postérieure obliquement tronquée, l'antérieure à contour externe faiblement sinueux.

Valve droite un peu moins convexe, à sculpture semblable ; oreillettes subégales, la postérieure obliquement tronquée, l'antérieure à échancrure byssale assez profonde, denticulée à sa base.

Test orné de nombreux cordons rayonnants imbriqués, très rapprochés, entrecroisés par des lamelles d'accroissement fines et serrées.

Coloration toujours plus vive sur la valve gauche que sur la droite et extrêmement variable, pouvant être blanche, jaune, orangée, rose, rouge, pourpre, soit monochrome, soit mélangée de zones blanches ou marquée de flammules et de taches.

Bord cardinal muni, au centre, d'une fossette ligamentaire, triangulaire, assez large.

Diamètre umbono-ventral : 40 à 70 mm. ; diamètre antéro-postérieur : 42 à 75 mm. ; épaisseur : 15 à 20 mm.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** — [Côtes sableuses de 10 à 160 mètres. Tandis que dans la Manche et l'Atlantique on trouve le plus communément le *P. opercularis* typique, la forme que l'on rencontre habituellement dans la Méditerranée, est la variété *Audouini* Payraudeau, moins arrondie, plus oblique, diversement marbrée ou tachetée de rouge et de blanc, avec une sculpture rayonnante très squameuse.

Noms vulgaires : Vanneau, Olivette.

**BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE,  
OUVRAGES PRINCIPAUX**

1758. — LINNÉ, *Systema Naturæ*, ed. X, p. 698 (*Ostrea opercularis*).
1784. — CHEMNITZ, *Conchylien-Cabinet*, VII, p. 341, pl. 67, fig. 646 (*Pecten opercularis* L.).
1826. — PAYRAUDEAU, *Catalogue des Mollusques de Corse*, p. 77, pl. II, fig. 8-9 (*Pecten Audouini*).
1853. — REEVE, *Conchologia Iconica*, VIII, *Pecten*, pl. XV, fig. 54 a-c (*Pecten opercularis* L.).
1870. — HIDALGO, *Moluscos marinos de España*, p. 121, pl. 35 A, fig. 3-4, pl. 36, fig. 1-5 (*Pecten opercularis* L.).
1889. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, *Mollusques marins du Roussillon*, II, p. 72, pl. XVII, fig. 1-2, pl. XVIII, fig. 1-8 (*Pecten opercularis* L.), pl. XVII, fig. 3-8 (var. *Audouini* Payr.).
1897. — DAUTZENBERG, *Atlas de poche des Coquilles des côtes de France*, pl. 36, fig. 128-129 (*Chlamys opercularis* L.).

ED. LAMY—1929.