



DIAGNOSE. — Corps large et trapu, légèrement comprimé en avant, très comprimé en arrière; sa hauteur, égale à la longueur de la tête, comprise 4 fois 1/2 dans la longueur totale; tête à profil antérieur nettement triangulaire, sa hauteur au niveau de l'orbite comprise à peine 1 fois 1/2 dans sa longueur; diamètre longitudinal de l'œil un peu plus grand que l'espace préorbitaire; paupières adipeuses très développées; opercule lisse, 2 fois 1/2 plus haut que large; mandibule dépourvue de dents et s'étendant en arrière jusqu'à l'aplomb du centre de l'œil; vomer lisse; langue, palatins et pterygoïdiens parfois armés de dents très fines; dorsale insérée beaucoup plus près du museau que de la base de la caudale: intervalle pré-dorsal faisant presque 1/3 de la longueur totale; intervalle pré-anal compris 1 fois 2/3 dans la longueur totale; ventrales insérées exactement au milieu du corps, à l'aplomb du tiers antérieur de la dorsale; caudale écaillée, très longue, comprise 4 fois 3/4 dans la longueur totale, profondément échancrée, ornée de chaque côté à sa base de deux courtes expansions aliformes; écailles solidement implantées, à bord libre perforé de nombreux trous.

D. 18; A. 18-19; V. 8; P. 17. Ec. long. 46-47; transv. 11.

Chevrons $17 + 14 = 31$; Vertèbres $14 + 32 = 46$.

Coloration : Dos gris-bleuâtre, flancs et ventre argenté brillant; pas de tache à l'opercule, une tache noire à la base du premier rayon de la dorsale et à l'extrémité des deux lobes de la caudale.

Longueur : jusqu'à 15 centimètres.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée : côtes d'Égypte. Canal de Suez jusqu'au lac Timsah. Atlantique : Côtes Sud du Maroc. Canaries.

BIBLIOGRAPHIE

1847. — CUVIER et VALENCIENNES. Histoire Naturelle des Poissons, XX, p. 193.
 1868. — GÜNTHER (A.). Catalogue of the Fishes in British Museum, VII, p. 421.
 1902. — TILLIER (J. B.). Le canal de Suez et sa faune ichthyologique (*Mém. Soc. Zool. France*, XV, p. 279).
 1916. — TATE REGAN. The British Fishes of the subfamily *Clupeinæ* and related species in other Seas. [*Ann. Mag. Nat. Hist.* (8) XVIII, p. 1.]
 1920. — FAGE (L.). Engraulidæ, Clupeidæ. (in *Rep. Dan. Océanogr. Expedit. 1908-10*, II, p. 124).
 1926. — KOEFOED (EINAR). Fishes from the Sea-Bottom (in *Report of the scient. Result. of the « Michael Sars » North Atlant. Deep. Sea Exped. 1910*, p. 33).

L. FAGE — 1929.