

TELEOSTEI


Apodes-Ophichthyidæ

Cœcula cœca

(LINNÆUS 1758).



1



2

DIAGNOSI — Corpo cilindrico, gracile, molto allungato. Coda conica terminante in punta. Lungh. fino a 50—60 cm.

Testa lunga conica, non distinta dal tronco. Muso un po' depresso, terminante in punta. Mascella superiore abbastanza sporgente, appuntita. Estremità della mascella inferiore più appressata all'orbita che all'apice del muso. Fenditura boccale estesa dietro l'occhio di un tratto maggiore che lo spazio preorbitale. Mascella con una serie di denti piccoli curvi. Lingua adnata. Intorno alla bocca distinti pori di canali di senso. Narice anteriore tubulosa avanti la bocca, sotto il bordo del muso. Narice posteriore sotto l'occhio sul bordo del labbro, circondata da un piccolo cercine. Occhio piccolo, visibile a occhio nudo negli esemplari grossi. Fenditure branchiali poste ventralmente, molto avvicinate.

Cœcula cœca (LINNÆUS 1758).

Pelle nuda. Linea laterale distinta alla parte anteriore. Pinne pettorali assenti. Dorsale e anale rudimentali. Coda priva di pinna. Ano posto circa a metà della lunghezza.

Numero delle vertebre 135 — 154, di cui 54 — 70 preanali.

Dorso rossastro disseminato di fitte macchie nere tondeggianti, fianchi rosso — giallastri, ventre bianco grigiastro. Talvolta il colore dominante è bruniccio.

Larva leptocefaliforme (*Leptocephalus Kefersteini* KAUP, partim) con muso breve, occhio rotondo, pinna dorsale molto corta. Intestino festonato con più di 10 macchie di pigmento. Punteggiatura sottolaterale formata da lineette nei miocommi, alternate da tratti in cui mancano. Nella regione codale 5—6 macchie profonde sottolaterali. Punteggiatura anale alla base della pinna. Una macchia dorsale e una ventrale sulla coda; alcuni punti sul capo. Ultimo ipurale lungo e sottile con 2 raggi, penultimo con 1.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. — Mediterraneo ; raro.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA

Fig. 1. Adulto. Originale, G. MONTI dis

Fig. 2. Larva lunga 102 mm. GRASSI, Tav. VII, fig. 1.

BIBLIOGRAFIA

1801. — BLOCH et SCHNEIDER. Systema Ichthyologiae, p. 535.
1810. — RAFINESQUE. Indice d'ittologia siciliana, p. 49. n° 376.
1826. — RISSO. Hist. Nat. Product. Eur. Merid. T. III, p. 194.
1844. — COSTA. Fauna Regno Napoli. Pesci. Tav. XXXII, fig. 1.
1870. — GÜNTHER. Catalogue Fishes British Mus. VIII, p. 89.
1875. — CANESTRINI. Fauna d'Italia. Pesci, p. 204.
1881. — MOREAU. Poissons de la France. III, p. 588.
1888. — JORDAN a. DAVIS. Rept. U. S. Fish. Comm. (1892), p. 614.
1889-93. — CARUS. Prodrömus faunæ medit. II, p. 545.
1913. — GRASSI. Metamorfosi dei Murenoidi, p. 121. Tav. VII. fig. 1-12.

SINONIMI

Muraena cæca L., *Sphagebranchus cæcus* Bl. Schn., *Cæcilia branderiana* Lacép., *Cæcula apterygia* Vahl, *Cecilia branderiana* Raf., *Apterichthys cæcus* (Dum.) de la Roche, *Sphagebranchus serpa* Risso, *S. bimaculatus* Risso, *S. Spallauzani* Costa, *Apterichthys cæcus* Kaup., *Ophichthys cæcus* Günth.

D'ANCONA 1929.