


TELEOSTEI
Acanthopterygii
Scianidæ

Corvina nigra

(Cuv. Val.)



DIAGNOSE — Corpo ovoidale, allungato verso la coda, ricoperto di squame mediocri ctenoidi con l'estremità posteriore delle medesime guarnite di spinole. L'altezza del corpo sta 3 a 3 1/2 volte nella lunghezza totale del pesce. Testa grossa, rigonfia, rivestita pure di squame, la sua lunghezza sta 4 volte nella lunghezza del corpo. Muso grosso, rigonfio, rivestito di 8 fori, 5 maggiori in una fila anteriore e 3 in una fila posteriore. Bocca piccola, orizzontale, il suo squarcio raggiunge il bordo anteriore dell'occhio. Labbra grosse. Mascelle fornite di denti villiformi, la superiore avanza di poco quella inferiore. Occhi mediocri, il loro diametro sta 4 1/2 volte nella lunghezza della testa. Preopercolo con l'angolo posteriore rotondato, margine superiore leggermente dentellato, opercolo con due punte piane.

Linea laterale arquata, sotto la seconda dorsale discende rapidamente per correre poi in linea retta fino alla base della codale. Contansi lungo la medesima circa 60 squame, in quella trasversale 30.

Prima dorsale con 10 raggi spinosi, il primo dei quali è brevissimo, il 4°, 5°, 6° sono i più lunghi, gli altri diminuiscono rapidamente in lunghezza, essa incomincia sopra l'inserzione delle pettorali. Seconda dorsale molto più bassa della prima alla quale è congiunta da una bassa membrana, conta 1 raggio osseo e 24 di molli. L'anale possiede due raggi ossei, il primo è breve, il secondo robustissimo, trigone e lungo e 7 raggi molli. Ventrali di forma triangolare con 1 forte aculeo e 5 di molli. Pettorali piuttosto brevi, poco sviluppate, contano 17 raggi molli. Codale quadrata con gli angoli rotondi, essa è bene sviluppata e possiede 18 raggi.

COLORAZIONE — Dorso e fianchi grigi con riflessi scuri e porporini, verso le parti inferiori queste tinte vanno scemando quasi fino ad un biancastro argenteo. La prima dorsale ha la sua base rossastra, l'apice molto scuro, così pure la seconda dorsale. Ventrali rossastre con l'apice più scuro, l'anale invece è nera con l'aculeo bianco.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA — E' specie comune nei mari centrali del Mediterraneo, meno frequente lungo le coste della Francia e della Spagna, come pure nell'Adriatico, nel Mar di Marmara e Bosforo. Poco frequente lungo le coste africane della Tripolitania fino a Porto-Saïd.

BIBLIOGRAFIA

1553. — BELON, *Tinca marina*, Bellonii Aquat. I.
1554. — RONDELET, *Coracinus subniger*, Aquat. L. V, p. 128.
1686. — WILLUGHBY, *Coracinus Rondeletii*, Aquat., p. 300.
1766. — LINNEUS, *Sciaena umbra*, Syst. Nat. p. 480.
1791. — BLOCH, *Sciaena nigra*, Aussl. Fische VI p. 35.
1810. — RAFINESQUE, *Sciaena cappa*, Indice pesci Sicil. p. 17.
1829. — CUVIER, *Corvina nigra*, R. A. II p. 175.
1830. — CUVIER ET VALENCIENNES, *Corvina canariensis*, Hist. Nat. Poissons V p. 93.
1830. — CUVIER ET VALENCIENNES, *Corvina nigra*, Hist. Poiss. V p. 86.
1850. — GUICHENOT, Explor. Alger p. 93.
1872. — CANESTRINI, Faun. Ital. p. 83.
1881. — MOREAU, Hist. Poiss. Fran. II p. 402.

E. NINNI 1932.