


TELEOSTEI

Pharyngognathi

Labridæ

# Crenilabrus roissali

(Risso).



**DIAGNOSE.** — Le corps est ovale, un peu comprimé latéralement, couvert d'écaillés assez grandes. La hauteur du tronc est comprise 3 fois  $1/4$  dans la longueur totale du poisson.

Tête grande ; son diamètre est compris 3 fois  $1/2$  dans la longueur totale du poisson. Le profil ascendant de la tête est presque rectiligne jusqu'à l'occiput. Museau court, plutôt émoussé.

La bouche est protactile, petite ; son ouverture forme le quart de la distance de la pointe du museau au bord antérieur de l'œil. Les mâchoires sont garnies antérieurement de dents pointues dirigées un peu en avant.

Œil de médiocre grandeur ; son diamètre est contenu presque 4 fois dans la longueur de la tête. Le bord inférieur du préopercule est pourvu de crênelures. La joue porte quatre à six rangées d'écaillés.

Ligne latérale bien visible, rectiligne, interrompue.

Dorsale peu haute, les derniers rayons mous sont plus longs que les autres, mais ils n'arrivent pas à l'insertion de la caudale ; celle-ci a la forme quadrangulaire ; sa longueur est contenue 7 fois dans la longueur totale. L'insertion de l'anale a lieu sous le penultième aiguillon de la dorsale. Ventrals petites ; les pectorales sont larges, quadrangulaires, elles arrivent jusqu'à l'anus.

**Coloration.** — Teinte générale verdâtre ; partie inférieure du poisson très claire, presque argentée, mais la coloration de cette espèce est très variable. Généralement la dorsale porte cinq taches noirâtres ; beaucoup d'exemplaires n'en portent que deux, la base de la caudale souvent est marquée d'une tache brune. Le long du corps il y a des lignes rouges. Sur l'opercule il y a une tache isolée brune violette. Les pectorales et les ventrals sont verdâtres ou jaunes. Les lèvres sont orangées.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.** — Commun dans la Méditerranée et sur les côtes de l'Océan Atlantique.

## BIBLIOGRAPHIE

1767. — PALLAS. Spic. Zool. *Labrus æruginosus*.  
1767. — PALLAS. Spic. Zool. *Labrus frenatus*.  
1767. — PALLAS. Spic. Zool. *Labrus capistratus*.  
1768. — BRUNNIC. Spolia mar. Adr., pag. 97. *Labrus*.  
1788. — BONNATERRE. Tabl. encycl., pag. 118. *Labrus guttatus*.  
1810. — RAFINESQUE. Car. Sicil, pag. 39. *Labrus oculos*.  
1820. — RISSO. Icht. Nice, pag. 276. *Lutjanus Roissali* (varius, Alberti).  
1826. — RISSO. Hist. Nat. Eur., pag. 323. *Crenilabrus Roissali*.  
1826. — RISSO. Hist. Nat. Nat. Eur., pag. 323. *Crenilabrus varius*.  
1826. — RISSO. Hist. Nat. Eur., pag. 323. *Crenilabrus tigrinus* (*quinquemaculatus*).  
1830. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Pois. XIII, pag. 205. *Crenilabrus Roissali*.  
1830. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Pois. XIII, pag. 205. *Crenilabrus quinquemaculatus*.  
1859. — GÜNTHER. Cat. of Fish. IV, pag. 62. *Crenilabrus quinquemaculatus*.  
1868. — CANESTRINI. Intorno Labroidi del Medit. Soc. Nat. Modena III, pag. 124. *Crenilabrus Roissali*.  
1881. — MOREAU. Hist. Nat. Pois. III, pag. 107. *Crenilabrus Roissali*.  
1923. — NINNI E. Primo cont. Pesci Turchia. Vol. V., pag. 35. *Crenilabrus Roissali*.  
1926. — DE BUEN F. Cat. Ich. Medit. Espan., pag. 110. *Crenilabrus quinquemaculatus*.

E. NINNI, 1933.