



## EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 2. Animal bien développé (M. lobes du manteau recouvrant la majeure partie du dos de la coquille, P. le pied). Gr. N. — Fig. 3. Région antéro- interne droite du manteau (o osphradium, Br. branchie, s. siphon, bu orifice buccal, r riphphore). Gross. 4/1. — Fig. 4. Fragment du bord du manteau. Gross. 12/1. — Fig. 5. Un autre fragment plus grossi. 30/1. — Fig. 6. Une rangée presque complète de dents radulaires (m. médiane, i,i intermédiaires, l,l latérales). Gross. 84/1.

**DIAGNOSE — Animal.** — Coloration générale du manteau, face externe, gris-blanchâtre sauf une bande noire le long des bords; les rebords palléaux internes d'un noir violacé intense, d'un aspect velouté; tête, rhinophores et siphon noirs; côtés du pied et du corps ainsi que la face ventrale d'un blanc brunâtre; branchie et osphradium blanc jaunâtre avec petites taches gris violacé.

Les rebords palléaux sont d'un aspect chagriné dû à la présence d'une multitude de petites granulations ou verrues polymorphes de un quart à deux tiers de millimètres de diamètre; bord siphonal lisse; parties latéro-dorsales du pied granuleuses.

Large branchie cténiforme; osphradium de grandeur moyenne, ayant ses trois rayons à peu près égaux.

Mâchoires nulles, mais existence en avant de la radula de fortes papilles cornées.

Radula de 130 à 150 rangées de dents ayant pour formule 2, 1, 1, 1, 2; dents médianes très grosses, massives, avec une longue cuspidé jaune ambré foncé; intermédiaires trois fois plus petites, avec cuspidé en virgule; latérales encore moins grosses, surtout la seconde l, offrant chacune deux minuscules denticules à leur base.

**Coquille** à test assez solide, ovale oblongue, subcylindrique, très convexe en dessus, assez plane en dessous, spire non visible; ouverture assez large, dilatée en avant, dents de force moyenne, à peu près égales, 19 à 28 dents marginales et 14 à 24 dents columellaires; bourrelets peu marqués.

Coloration de la face dorsale du gris souris clair au gris foncé roussâtre à reflets irisés; avec trois larges bandes transversales de la même teinte accentuée, mais plus ou moins visibles; face inférieure fauve clair légèrement rose chair, blanc porcelaine à l'ouverture; deux taches noires se trouvent dorsalement à chaque extrémité.

Dimensions: moyennes de 35 à 55 millimètres de long sur 18 à 30 de large et 16 à 24 de haut.

Coquille oliviforme très fragile, d'un brun clair, ayant vers la fin de cette période deux bandes transversales claires et étroites qui apparaissent.

Coquille jeune à test moins fragile, à coloris plus accentué, les deux bandes transversales sont plus nettes, les quatre petites taches brun noirâtres apparaissent et les dents de l'ouverture commencent à se former, mais sont moins nombreuses.

Nombreuses variétés de teinte ou de taille.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** — Méditerranée: Marseille (Marion, Vayssière); Nice (Vérany, Vayssière), Monaco (Richard), Gênes (Vérany), Corse (Réquien), Naples (Risso, Scacchi, Dorhn), Sicile (Philippi, Monterosato), Venise (Weinkauff), Mer Egée (Forbes), Alger, Bône (Weinkauff), Oran (Pallary), Les Baléares (Hidalgo), Valence, Barcelone (Hidalgo).

Océan Atlantique: des côtes du Portugal jusqu'à celles de Guinée (Hidalgo, Pallary); Açores (Dautzenberg).

#### BIBLIOGRAPHIE ET SYNONYMIE

1758. -- LINNÉ. *Systema Naturæ*. X<sup>e</sup> Edition.  
1826. -- RISSO. *Hist. Natur. de l'Europe Méridionale, particulièrement de Nice et des Alpes-Maritimes*.  
1836 et 1844. -- RUD. PHILIPPI. *Fauna Molluscorum Regni utriusque Siciliae*.  
1862. -- J.-B. VÉRANY. *Zoologie des Alpes-Maritimes (extr. de la Statistique du Département)*.  
1882-1888. -- DAUTZENBERG. *Les Mollusques marins du Roussillon*.  
1893. -- J.-V. CARUS. *Prodr. Faunæ Mediterraneæ*; Vol. II.  
1900. -- P. PALLARY. *Coquilles marines du littoral du Département d'Oran*.  
1917. -- J.-G. HIDALGO. *Fauna malacologica de Espana, Portugal y las Baleares*.  
1923 et 1927. -- A. VAYSSIÈRE. *Recherches zoologiques et anatomiques sur les Cypræidés. (Ann. Musée d'Hist. natur. de Marseille; 1<sup>re</sup> partie, tome XVIII et 2<sup>e</sup> partie, tome XXI)*.

A. VAYSSIÈRE — 1929.