


TELEOSTEI  
*Apodes-Echelidæ*

# Echelus myrus

(LINNÆUS, 1758)



## EXPLICATION DE LA PLANCHE

*Fig. 1.* Individu adulte. Dessin de Mercuriano, de la Station Zoologique de Naples. — *Fig. 2.* Larve, Grassi, pl. VII, fig. 14.

**Echelus myrus** (LINNÆUS, 1758)

**DIAGNOSE** - Corps cylindrique, légèrement comprimé vers la queue. Hauteur du corps contenue une vingtaine et plus de fois dans la longueur totale. Longueur jusqu'à 80 centimètres.

Tête contenue 9-10 fois dans la longueur totale, assez pointue. Museau aplati dorsalement. Mâchoire supérieure proéminente, fente buccale étendue jusqu'au bord postérieur de l'œil. Groupe de petites dents coniques aigues au bout de la mâchoire supérieure; bande assez large de dents courtes pointues, un peu crochues, sur les côtés de la mâchoire même. Sur le vomer groupe en losange de dents tuberculaires. Mandibule avec une large bande de dents courtes, à pointe aigüe ou mousse, retrocurves. Langue adnée. Yeux ovales, légèrement allongés horizontalement, contenus 8-9 fois dans la longueur de la tête, environ 2 fois dans l'espace préorbitaire. Narine antérieure tubuleuse, dirigée en bas, au bout du museau; narine postérieure en forme de fente oblique sur le bord extérieur de la lèvre supérieure.

Nageoires pectorales présentes avec une douzaine de rayons; dorsale étendue jusqu'à la fin des pectorales; caudale très courte. Anus situé avant le milieu du corps. Ligne latérale bien distincte avec une série de petites taches rondes, blanchâtres, éloignées les unes des autres; quelque fois, dans les sujets les plus grands, ces taches ne sont pas visibles en arrière de l'anüs.

Peau sans écailles.

Dos gris-verdâtre, parfois rougeâtre. Ventre gris-jaunâtre. Tête violacée traversée de raies blanchâtres; une raie transversale sur l'occiput. Séries de points blanchâtres au côtés du museau. Autres taches blanchâtres en arrière de l'œil, sur la nuque et au dessus de la pectorale. Nageoires impaires blanchâtres bordées de noir, pectorales rosées.

151-155 vertèbres, dont 54-58 préanales.

Larve leptocéphalienne (*Leptocephalus Kefersteini* Kaup part.) avec le museau pointu; pectorale distincte, dorsale assez étendue en avant de l'anüs, queue arrondie; intestin festonné, avec taches noires susintestinales correspondant aux rentrées, et points sousintestinaux; taches souslatérales profondes dans la région postanale; autre pigment souslatéral dans les myocommes; ponctuation à la base de la nageoire anale et pigment au bout caudal; pigment sur la mâchoire supérieure et sous les branchies.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** — Méditerranée, Golfe de Gascogne. Vit sur les fonds sableux et boueux jusqu'à 150 m. de profondeur.

#### BIBLIOGRAPHIE

1810. — RAFINESQUE. Indice Ittiol. Siciliana.  
1836. — COSTA. Fauna Regno Napoli. Pesci. pl. 33.  
1856. — KAUP. Cat. Apodal Fish. p. 31. fig. 14.  
1870. — GÜNTHER. Cat. Fishes Brit. Mus. VIII, p. 50.  
1875. — CANESTRINI. Fauna d'Italia. Pesci. p. 200.  
1881. — MOREAU. Hist. nat. Poissons France. III. p. 572.  
1889-93. — CARUS. Prodomus faunæ medit. II. p. 543.  
1913. — GRASSI. Metamorfosi dei Murenoidi p. 124. Pl. VII et XIV.

#### SYNONYMIE

*Muraena myrus* L., *Echelus punctatus* Raf., *Conger myrus* Cuv., *Myrus vulgaris* Kaup.

D'ANCONA.