

TELEOSTEI
Plectognathi-Tetraodontidæ

Ehippion (*Tetrodon*) *guttifer*

(BENNETT 1830)



FIG. 1. — *Ehippion (Tetrodon) guttifer* Bennett.
Vue latérale.




FIG. 2. — *Ehippion (Tetrodon) guttifer* Bennett.
Partie antérieure.

DIAGNOSE. — Longueur totale : 0 m. 50 environ.

Corps oblong. Sur le dos et sur les côtés du ventre, scutelles granuleuses très irrégulières : les petites granulations y forment comme un semis. Vers la partie postérieure les granulations sont remplacées par des productions lancéolées cachées sous les téguments. Gorge et abdomen possédant de très nombreuses petites épines également cachées, mais pouvant faire saillie au dehors par de petits pertuis allongés dans le sens antéro postérieur.

Tête nue. Museau tronqué. Bouche munie de lèvres épaisses, finement lobées et armée des quatre dents typiques. Dents de la mâchoire supérieure beaucoup plus grandes que celles de la mandibule.

Ehippion (*Tetrodon*) *guttifer* (BENNETT 1830)

Yeux petits. Espace interorbitaire aplati. En arrière, à partir d'une ligne qui réunit le bord postérieur des orbites, s'étend une carène mousse qui va jusqu'au niveau des fentes branchiales.

Narines tubulées, bordées en arrière par une expansion lamelleuse, semi-circulaire, présentant du côté interne un épaissement tentaculaire. En avant, et du côté externe, on trouve une petite languette fine et plus haute que l'épaississement interne. Le tube est ouvert à la partie antérieure.

La Dorsale est située au-dessus et un peu en avant de l'anale.

D 9 à 11 ; A 8 à 10 ; P 21

COLORATION. — Dos gris brunâtre tirant sur le vert. Cette teinte fondamentale est ponctuée de petites taches plus ou moins arrondies ou elliptiques dont la plupart sont blanc pur, mais dont quelques-unes sont centrées par une macule grise. Ces dernières sont donc en forme de couronne.

Le ventre est blanc.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Côte atlantique d'Afrique. Très rare en Méditerranée : Espagne (Malaga) ; Algérie.

Baie de Sidna-Youcha (département d'Oran) ; Ténès, Bou-Haroun (département d'Alger).

SYNONYMIE

Tetrodon guttifer Bennett ; *Hemiconiatus guttifer* Gnthr.

BIBLIOGRAPHIE

1830. — BENNETT, *Proc. Comm. Zool. Soc.* p. 148 (*Tetrodon guttifer*).
1870. — GUNTHER (D^r A.), *Cat. of Fishes in the British Mus.* vol. VIII (*Hemiconiatus guttifer*).
1884. — CARUS, *Prodr. Faun. Méd.* II, p. 537.
1926. — DE BUEN (F.), *Cat. ict. del Med. Esp.*
1932. — DIEUZEIDE (D^r R.), *Bulletin Travaux Station d'Aquiculture et de Pêche de Castiglione (Algérie)*. Fasc. I, pp. 69-78.

D^r R. DIEUZEIDE 1933.