


Epinephelus aeneus

GEOFFROY SAINT-HILAIRE 1809

TELEOSTEI
Physoclisti
Perciformes - Serranidæ



Epinephelus aenus. STEINDACHENR. Fische Afrika's. Taf. II, fig. 1. (*Serranus aeneus*.)

DIAGNOSE GÉNÉRIQUE. — (Genre *Epinephelus*. BLOCH, 1793.) Serranidés au corps plus ou moins comprimé, recouvert de petites écailles cycloïdes ou denticulées. Bouche large, protractile. Maxillaire visible, avec un os supplémentaire. Mâchoires garnies de plusieurs séries de dents coniques. Dents vomériennes et palatines. Pas de dents linguales.

Préopercule généralement denticulé. Opercule avec de 1 à 3 épines.

Tête écailleuse. Sept rayons branchiostèges. Une pseudobranchie.

Une seule dorsale avec de 9 à 11 épines et de 12 à 21 rayons mous. Anale à 3 épines et 8 à 12 rayons mous. Ventrales sous les pectorales, munies d'une forte épine. Ligne latérale complète.

DIAGNOSE SPÉCIFIQUE. — **Corps.** — La hauteur du corps, assez variable, est comprise environ 4 fois 1/2 dans la longueur totale (caudale comprise).

Coloration. — Du jaune brun au brun vert, marbré de taches plus sombres formant 5 larges bandes, peu visibles chez les individus âgés. Deux ou trois lignes obliques bleu clair, dirigées en arrière et en bas sont visibles en arrière de l'œil.

Anale et ventrales avec un bord bleu.

Tête. — La longueur de la tête est comprise 3 fois environ dans la longueur totale. Le diamètre de l'œil de 4 fois 4/5 à 5 fois dans la longueur de la tête ; le museau 4 fois ou plus, dans la même longueur.

Bord postérieur du préopercule incliné en arrière et denticulé. Dans l'angle : de 3 à 6 épines très prononcées. Bord inférieur du préopercule lisse.

Nageoires. — *Dorsale.* — 11 rayons épineux, le 3^e le plus long (1/3 de la longueur de la tête); 15 rayons mous.

Anale. — 3 épines, la 2^e et 3^e longues, 8 rayons mous.

Pectorales. — Longueur comprise 1 fois 8/10 dans longueur de la tête.

Ventrals. — Presque aussi longues que pectorales.

Caudale. — Arrondie.

Rayons branchiostèges : VII.

Dorsale : XI + 15. Anale : III + 8-9.

Ligne latérale : 79-82.

Taille courante : 15 à 45 centimètres.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Méditerranée (Egypte). Côte occidentale d'Afrique : Mauritanie, Sous, Sénégal, Gorée, Cameroun.

SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, OUVRAGES PRINCIPAUX

1809. — GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. Poiss. d'Egypte. Pag. 208. (*Serranus aeneus*.)

1833. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poiss. Vol. II, p. 283. (*Serranus aeneus*.)

1859. — GÜNTHER. Catalogue of Fishes. Vol. I, p. 134. (*Serranus aeneus*.)

1881. — STEINDACHNER. Fische Afrika's. Pag. 5. taf. II, fig. 1. (*Serranus aeneus*.)

Jean LE GALL, 1933.