



EXPLICATION  
DES  
FIGURES

*Fig. 1.* Animal vu de dos. Gros. 8/1.  
*Fig. 2.* Mâchoire de droite, face interne. Gros. 30/1. — *Fig. 3.* Une dent médiane et deux latérales de droite. Gros. 450/1. — *Fig. 4.* Ruban nidamental. Gros. 12/1. — *Fig. 5.* Organe copulateur. Gros. 50/1. — *Fig. 6.* Nématocystes. Gros. 800/1.

**DIAGNOSE** — Corps allongé, large et comprimé. Rhinophores très longs avec nombreuses lamelles olfactives, transversales-perpendiculaires, sur toute leur longueur; tentacules labiaux très longs,

Corps d'une belle teinte violette, avec des punctuations d'un brun pâle éparses à la surface du dos, mais plus nombreuses à la base des pédoncules des cirres dorsaux.

Tentacules labiaux longs, d'un violet plus foncé que les téguments dorsaux, sauf à leur extrémité qui est blanchâtre.

Rhinophores aussi longs que les tentacules labiaux, offrant la même coloration (violet dans les quatre cinquièmes inférieurs de leur longueur et blanc jaunâtre à leur extrémité), munis dans toute leur étendue de lamelles olfactives violettes, transversales-annulaires, au nombre de vingt-cinq à trente.

Cirres dorsaux disposés en houppes sur les côtés du corps (sept houppes de chaque côté); ces groupes de cirres sont portés chacun par une sorte de pédoncule charnu, bifurqué, sauf pour les derniers groupes. Ces cirres sont cylindro-coniques, assez longs, mais grêles; le prolongement hépathique est étroit et d'un rouge brunâtre. A l'extérieur, ces organes sont blanchâtres même à leur extrémité effilée, d'un beau violet au-dessous, et d'un violet pâle dans le reste de leur étendue, c'est-à-dire dans la majeure partie de leur étendue.

Pied presque de la même longueur que le corps, avec angles antérieurs un peu tentaculiformes aigus.

Pénis inerme, long et conique.

Mâchoires présentant sur le bord masticateur et sur la face interne de ce bord, de nombreux denticules. — Radula trisériée: dent médiane avec pointe crochue et six denticules assez forts de chaque côté, bord d'insertion profondément échancré; dents latérales très grandes, mais minces, à bord interne muni de quelques petites dentelures.

Ruban nidamentaire long, étroit, cylindrique, un peu comprimé, décrivant des sinuosités irrégulières.

Dimensions: 10 à 12 millimètres de longueur sur 1 à 1 mm.5, de largeur.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** — Méditerranée: Marseille (VAYSSIÈRE); Nice (RISSO); Gênes (VERANY, TRINCHESE); Naples (CAVOLINI, DELLE-CHIAJE, COSTA); Trieste (GRAEPFE).

#### BIBLIOGRAPHIE ET SYNONYMIE

1776. — GMELIN. (LINNÉ. *Systema naturæ*, XIII<sup>e</sup> Edit — *Doris affinis*).
1866. — A. COSTA. Mollusques Nudibranches. « *Annuario di Museo Zool. d. R. Università di Napoli* ».
1888. — A. VAYSSIÈRE. Rech. Moll. Opisthobranches du Golfe de Marseille. (*Ann. Mus. H. Nat. de Marseille*), t. III, 1888,
1913. — A. VAYSSIÈRE. Mollusques de la France. tome I<sup>er</sup> (*Opisthobranches*). Paris. O. Dain, Éditeur.

A. VAYSSIÈRE, 1928