


# Gadus capelanus

(Risso 1826)

## TELEOSTEI

### Gadidae



*minutus* O. Fr. Mül. (*Arch. de Zool. Exp. et Gén.*, 5<sup>e</sup> ser., t. VI. p. 257 à 282. pl. XIV et XV).

# Gadus capelanus

(Risso 1826).

**DIAGNOSE** — Corps allongé, à écailles caduques ; sa plus grande hauteur, au niveau de la première Dorsale, faisant en moyenne 23 % de la longueur totale. Anus situé généralement à l'aplomb du milieu de la première Dorsale, et séparé du bout du museau par un intervalle égal, en moyenne, à la longueur de la première Anale, c'est-à-dire à 32 % de la longueur totale. Ligne latérale à courbure antérieure accentuée.

Longueur de la tête égale à 25 % de la longueur totale ; diamètre de l'œil, un peu plus grand que l'espace préorbitaire, contenu 3 fois  $\frac{1}{2}$  dans la longueur de la tête ; bouche largement fendue, la mandibule plus courte que la mâchoire, son barbillon à peine égal au diamètre de l'œil.

Première Dorsale triangulaire ; deuxième et troisième Dorsales indépendantes. Les deux Analles indépendantes, séparées par un très court intervalle. Troncature postérieure de la dernière Dorsale et de la dernière Anale très faiblement oblique, presque verticale. Caudale légèrement échancrée.

Vessie urinaire lobée.

D<sup>1</sup> : 11 (12) 13 ; D<sup>2</sup> : 16 (19) 21 ; D<sup>3</sup> : 17 (18) 20 ; A<sup>1</sup> : 26 (28) 30 ; A<sup>2</sup> : 16. 18 (20) ; C. 39 ; P. 19 ; V. 6 ; Vert. 48-49.

Longueur totale jusqu'à 20 centimètres.

Dos brunâtre, ventre argenté ; ventrales gris rosé.

Reproduction : œufs pélagiques en Février et Mars.

Espèce intermédiaire aux *Gadus luscus* L. et *minutus* O. F. Müll., mais plus voisine de ce dernier.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** — Méditerranée. Côte atlantique du Maroc.

## BIBLIOGRAPHIE

1826. — Risso (A.) Histoire naturelle de l'Europe méridionale (Paris, III. p. 226).

1911. — FAGE (L.). Le Capelan de la Méditerranée : *Gadus capelanus* (Risso) et ses rapports avec les espèces voisines : *G. luscus* L. et *G.*

L. FAGE