


1

**DIAGNOSE** — Corps allongé, comprimé ; hauteur du corps comprise  $5 \frac{1}{2}$  -  $6 \frac{1}{2}$  fois dans la longueur totale. Longueur atteint 50 centimètres.

Tête conique, aplatie supérieurement ; sa longueur comprise  $4-4 \frac{1}{4}$  fois dans la longueur totale. Museau court, obtus. Bouche grande ; mâchoire inférieure un peu proéminente, ou les deux mâchoires égales. Muqueuse buccale bleuâtre ou violette. Mâchoires avec une bande de dents très petites ; extérieurement une rangée de dents crochues plus grandes ; à chaque côté du vomer 1-4 dents. Maxillaire supérieur dépassant en arrière la marge antérieure de l'œil. Pas de barbillon. Narines proches, en avant de la marge supérieure de l'œil, plus rapprochées de celui-ci que du bout du museau. Œil grand, rond ; son diamètre fait environ  $\frac{1}{4}$  de la longueur de la tête ; il est presque égal ou un peu moindre que l'espace préorbitaire.

Ligne latérale droite, rapprochée du profil dorsal. Anus très en avant, à moins de  $\frac{1}{3}$  de la longueur totale. Pectorales allongées à 20 rayons. Ventrals jugulaires, plus petites, allongées, à 6 rayons. 3 dorsales triangulaires ; les deux premières plus hautes que longues. Distance entre les deux premières presque égale à la longueur de la base de la seconde ; distance entre les deux postérieures notablement plus grande. Première dorsale commençant quelque peu en avant du niveau de l'anus. Rayons des trois dorsales 11-14, 10-13, 20-24. Première anale commençant immédiatement en arrière de l'anus, longue, avec 34-38 rayons ; deuxième plus courte, opposée à la troisième dorsale, avec 20-26 rayons. Caudale avec la marge postérieure droite ou peu échancrée, avec  $5\frac{25}{6}$  rayons.



2

**EXPLICATION DES FIGURES**

*Fig. 1* Exemple adulte. VICINGUERRA, pl. II, fig. 1.

*Fig. 2.* Stade postalarvaire de  $6 \frac{2}{3}$  mm. SCHMIDT, 1905, fig. 61.

Corps couvert d'écaillés petites. Couleur générale gris-brunâtre au dos, argentée sur les côtés et au ventre. Une tache noirâtre plus ou moins marquée à l'aisselle de la pectorale (quelquefois absente) ; une tache peu marquée sur l'opercule. Nageoires dorsales grisâtres, anales blanchâtres, pectorales brunes.

Stades postlarvaires jeunes reconnaissables parmi ceux des autres *Gadus* par la présence d'une ligne de pigment dorsale et d'une ventrale plus courte, opposées, dans la région postanale. Stades plus développés reconnaissables par la distance entre les deux dorsales postérieures.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** — Méditerranée, assez fréquent. Atlantique ; côtes européennes jusqu'à l'Islande et à la Norvège (cercle polaire).

#### SYNONYMIE

*Merlangus poutassou* Risso, *M. melanostomus* Valenc., *M. communis* Costa, *M. vernalis* Risso, *M. albus* Yarr., *Gadus melanostomus* Nilsson, ? *Gadus merlangus* Risso, *Pollachius poutassou* Bp.

#### BIBLIOGRAPHIE

1829-50. — COSTA. Fauna Napoli. Pesci.

1878. — COUCH. Hist. Fishes Brit. Islands, III, p. 77, Pl. CXXI.

1881. — MOREAU. Hist. Nat. Poissons France, III, p. 245, Fig. 176.

1883. — VICINGUERRA. Annali Mus. St. Nat. Genova, XVIII, p. 550.

1905. — SCHMIDT. Meddel. Komm. Havunders, Fiskeri, Bd. I, Nr. 4, p. 58, Fig. 16 ; Pl. III, fig. 10-15.

1906. — SCHMIDT. Meddel. Komm. Havunders, Fiskeri, Bd. II, Nr. 2, p. 11, Fig. 28-32.

U. D'ANCONA — 1931.