


1

DIAGNOSE — Corps allongé, comprimé ; hauteur du corps comprise $5 \frac{1}{2}$ - $6 \frac{1}{2}$ fois dans la longueur totale. Longueur atteint 50 centimètres.

Tête conique, aplatie supérieurement ; sa longueur comprise $4-4 \frac{1}{4}$ fois dans la longueur totale. Museau court, obtus. Bouche grande ; mâchoire inférieure un peu proéminente, ou les deux mâchoires égales. Muqueuse buccale bleuâtre ou violette. Mâchoires avec une bande de dents très petites ; extérieurement une rangée de dents crochues plus grandes ; à chaque côté du vomer 1-4 dents. Maxillaire supérieur dépassant en arrière la marge antérieure de l'œil. Pas de barbillon. Narines proches, en avant de la marge supérieure de l'œil, plus rapprochées de celui-ci que du bout du museau. Œil grand, rond ; son diamètre fait environ $\frac{1}{4}$ de la longueur de la tête ; il est presque égal ou un peu moindre que l'espace préorbitaire.

Ligne latérale droite, rapprochée du profil dorsal. Anus très en avant, à moins de $\frac{1}{3}$ de la longueur totale. Pectorales allongées à 20 rayons. Ventrales jugulaires, plus petites, allongées, à 6 rayons. 3 dorsales triangulaires ; les deux premières plus hautes que longues. Distance entre les deux premières presque égale à la longueur de la base de la seconde ; distance entre les deux postérieures notablement plus grande. Première dorsale commençant quelque peu en avant du niveau de l'anus. Rayons des trois dorsales 11-14, 10-13, 20-24. Première anale commençant immédiatement en arrière de l'anus, longue, avec 34-38 rayons ; deuxième plus courte, opposée à la troisième dorsale, avec 20-26 rayons. Caudale avec la marge postérieure droite ou peu échancrée, avec $5\frac{2}{5}/6$ rayons.



2

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1 Exemple adulte. VICINGUERRA, pl. II, fig. 1.

Fig. 2. Stade postalarvaire de $6 \frac{2}{3}$ mm. SCHMIDT, 1905, fig. 61.

Corps couvert d'écaillés petites. Couleur générale gris-brunâtre au dos, argentée sur les côtés et au ventre. Une tache noirâtre plus ou moins marquée à l'aisselle de la pectorale (quelquefois absente) ; une tache peu marquée sur l'opercule. Nageoires dorsales grisâtres, anales blanchâtres, pectorales brunes.

Stades postlarvaires jeunes reconnaissables parmi ceux des autres *Gadus* par la présence d'une ligne de pigment dorsale et d'une ventrale plus courte, opposées, dans la région postanale. Stades plus développés reconnaissables par la distance entre les deux dorsales postérieures.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée, assez fréquent. Atlantique ; côtes européennes jusqu'à l'Islande et à la Norvège (cercle polaire).

SYNONYMIE

Merlangus poutassou Risso, *M. melanostomus* Valenc., *M. communis* Costa, *M. vernalis* Risso, *M. albus* Yarr., *Gadus melanostomus* Nilsson, ? *Gadus merlangus* Risso, *Pollachius poutassou* Bp.

BIBLIOGRAPHIE

- 1829-50. — COSTA. Fauna Napoli. Pesci.
1878. — COUCH. Hist. Fishes Brit. Islands, III, p. 77, Pl. CXXI.
1881. — MOREAU. Hist. Nat. Poissons France, III, p. 245, Fig. 176.
1883. — VICINGUERRA. Annali Mus. St. Nat. Genova, XVIII, p. 550.
1905. — SCHMIDT. Meddel. Komm. Havunders, Fiskeri, Bd. I, Nr. 4, p. 58, Fig. 16 ; Pl. III, fig. 10-15.
1906. — SCHMIDT. Meddel. Komm. Havunders, Fiskeri, Bd. II, Nr. 2, p. 11, Fig. 28-32.

U. D'ANCONA — 1931.