



DIAGNOSIS — Cuerpo alto, de poco grosor. — De la longitud total del cuerpo, la altura el 23,5, la anchura el 14-16 y el 25-30'5 la longitud de la cabeza, por cien. La endidura bucal no llega a la altura del ojo.

Sobre la misma vertical, el primer radio de la dorsal espinosa y la base de los mas próximos de la pectoral. — Comienza la anal muy poco mas atrás que la segunda aleta del dorso y termina sensiblemente a la misma altura. La pectoral, apoyada, llega hasta el primer radio de la segunda dorsal.

1 D. 6 : 2 D 1/15 ; C x + 14 + x ; A 1/16-17 ; P. 22 ; V. (1/5 + 1/5) ; rad. branq., 5.

Todo el cuerpo, nuca y garganta, están cubiertos de escamas poco adherentes. Dejando libres los recorridos de geniporos, en el preoperculo y operculo, hay escamas sin borde espinoso. 25-26 escamas en linea longitudinal y 7 (8) en la transversal.

Geniporos gruesos, muchos de ellos unidos en su base formando costras dérmicas. Serie longitudinal de la nuca *gh* unica y continua, dejando un espacio desnudo de escamas, entre las dos simétricas.

Color blanco azulado con bandas verticales difusas amarillas. El borde libre de las escamas punteado de negro en una línea estrechísima.

Tres bandas amarillas cruzan la nuca transversalmente, adquiriendo brillantez e intensidad al pasar las series dorsales anteriores de poros *gh*.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA — Sur de España, en la costa atlántica y mediterránea.

EXPLICACION DE LA LAMINA

Fig. 1. Ejemplar adulto y macho, según FERNANDO DE BUEN, fig. 13.

Fig. 2. Series de geniporos en la región cefálica, FERNANDO DE BUEN, fig. 14.

BIBLIOGRAFIA, ICONOGRAFIA, SINONIMIA OBRAS PRINCIPALES

1925. — F. DE BUEN, *Gobius de la Pen. Ibérica*. — *Mem. X, Inst. esp. de Oceanografía*, p. 162-168, fig. 13-18.

F. DE BUEN