


SELACHII

Hexanchiformes-Hexanchidae

Heptranchias cinereus

(GMELIN 1788)



Heptranchias cinereus (GMELIN 1788)

EXPLICATION DE LA LAMINA

Ejemplar adulto según Bonaparte

DIAGNOSIS — Cuerpo fusiforme alargado, con cabeza estrecha y larga. Morro agudo. Boca amplia, poco arqueada. Espiráculos muy pequeños, más próximos de la primera abertura branquial que del ojo.

Dorsal única, muy retrasada, de poco tamaño, colocada entre las aletas ventales y la anal. Pectorales de forma trapezoidal y de poca altura, y ancha base las ventrales y anal. Larga aleta caudal con el lóbulo inferior bien pronunciado y algo saliente.

Piel poco aspera al tacto, denticulos dermicos muy pequeños, Dientes de la mandibula superior con una sola punta, ganchudos los laterales con denticulaciones basales; los ultimos pavimento-sos. El pequeño diente medio de la mandibula inferior con punta vertical aserrada en sus margenes laterales; los que le siguen en forma de peine, con pequeñas puas, al pie y delante, de la punta mas saliente.

Linea lateral bien aparente.

Aberturas branquiales en número de siete por lado y extensas.

Cuerpo dorsalmente ceniciento, vientre blanco rosado. Longitud de unos 2 à 3 metros.

DISTRIBUTION GEOGRAFICA — Mediterraneo. Atlantico.

BIBLIOGRAFIA, ICONOGRAFIA, SINONIMIA OBRAS PRINCIPALES

- 1788. — GMELIN (*Squalus cinereus*). Syst. Nat. t. I. p. 1497.
- 1810. — RAFINESQUE (*Heptranchias cinereus*). Ind. Itt. Sicil. p. 45. n° 327.
- 1816. — BLAINVILLE (*Monopterrhinus cinereus*) Prodr. Bull. Soc. Philomat. p. 121.
- 1829. — CUVIER (*Notidanus cinereus*). R. Anim. 2^e ed. t. II. p. 390.
- 1841. — BONAPARTE (*Notidanus cinereus*). Icon. Faun. Ital. pl. 137 (54 Pesci) Fig 2.
- 1841. — MÜLLER Y HENLE (*Heptanchus cinereus*). Plagiost. p. 81. lam. XXXV, fig. 3 (dientes).

F. DE BUEN 1930.