



**DIAGNOSIS** — Cuerpo fusiforme alargado, mas grueso anteriormente. Piel con denticulos pequeños, trapezoidales, aplastados y desiguales.

Dorsal, única, muy retrasada, pequeña, comenzando hacia la mitad de la base de las ventrales. Poco mas pequeña la anal muy proxima a la caudal; esta última aleta muy amplia, con lóbulo inferior, poco aparente. Pectorales trapezoidales.

Cabeza ancha, aplastada. Morro corto y redondeado. Boca grande con pliegue labial superior bien desarrallado. Ojos grandes. Espiráculos muy pequeños, colocados equidistantes del ojo y de la primera abertura branquial. Dientes desiguales; los superiores con una sola punta, apareciendo en los laterales, en la parte externa de su base, algunas puntas secundarias; al término son los dientes pavimentosos; los inferiores con diente medio pequeño, subpiramidal, ligeramente dentellado en su ápice, mayores los restantes, son anchos, con borde cortante hacia dentro y muy aserrados hacia fuera.

Linea lateral bien aparente.

Aberturas branquiales en número de seis, muy largas y próximas entre si.

Cuerpo dorsalmente gris obscuro con tinte rojizo, mas claro en el vientre. Longitud 1-3 metros.

**DISTRIBUCION GEOGRAFICA** — Mediterraneo. - Atlántico.

#### EXPLICACION DE LA LAMINA

Ejemplar adulto, segun Bonaparte.

#### BIBLIOGRAFIA, ICONOGRAFIA, SINONIMIA

##### OBRAS PRINCIPALES

1788. GMELIN. (*Squalus griseus*). Syst. Nat., ed. GMELIN, p. 1495.  
 1810. RISSO. (*Squalus griseus*). Ichth. Nice p. 37.  
 1810. RAFINESQUE. (*Hexanchus griseus*). Caratteri anim. e piante della Sicilia, p. 14.  
 1816. BLAINVILLE. (*Monopterhinus griseus*). Bull. des Sciences, p. 121.  
 1817. CUVIER. (*Notidanus griseus*). Rég. anim., ed. I, p. 128.  
 1826. RISSO. (*Notidanus monge*). Hist. nat. III, p. 129.  
 1832. BONAPARTE. (*Notidanus griseus*). Icon. italica, fig.

F. DE BUEN — 1930.