


TELEOSTEI
Acanthopterygii
Labriiformes - Labridæ

Labrus mixtus

KRÖYER, 1838



EXPLICATION DES FIGURES

En haut : le mâle. — *En bas* : la femelle.

(LE DANOIS. Poissons de la Manche Occidentale. Paris, 1913).

DIAGNOSE GÉNÉRIQUE — Labridés au corps oblong, à la dorsale de hauteur uniforme sur toute sa longueur. Plus de 18 rayons épineux. Joues et opercules écailleux. Plus de six rangées d'écailles sur les joues. Interorbitaire et partie postérieure de la tête nus. Dents des mâchoires nettement séparées. Une seule rangée est nettement visible. Pas de « canines » postérieures.

Ligne latérale à plus de 40 écailles. Au-dessus de cette ligne, plus de 6 rangées d'écailles. Vessie natatoire large et courte. Tractus digestif sans dilatation stomacale ni appendices pyloriques.

DIAGNOSE SPÉCIFIQUE — *Corps* — Ovale, allongé, couvert de grandes écailles presque rectangulaires au bord externe arrondi. Hauteur comprise de 4 fois $\frac{1}{3}$ à 4 fois $\frac{1}{4}$ dans la longueur totale, celle-ci atteignant de 30 à 45 cm. chez l'adulte.

Coloration — Très variable suivant le sexe :

Mâle : vert noir, avec de larges bandes bleues sinueuses sur la tête et cinq bandes irrégulières de même couleur sur le corps. Ventre jaune avec points bleus. Nageoires bordées de bleu.

Femelle : rouge orangé avec de petites taches bleues éparses : nageoires verticales bordées de bleu-noir. Trois ou quatre taches noires à la base de la dorsale.

Tête — Profil antérieur rectiligne, formant un angle d'environ 60° la bouche fermée. Museau allongé : longueur égale au $\frac{1}{3}$ de la longueur de la tête, celle-ci étant égale au $\frac{3}{11}$ de la longueur totale. L'espace interorbitaire est compris une fois $\frac{2}{3}$ à 2 fois dans la longueur du museau et le diamètre de l'œil est compris trois fois dans cette longueur.

Bouche petite avec lèvres très épaisses, surtout la supérieure. Dents épaisses coniques et sur une seule rangée. Celles de la partie antérieure sont les plus fortes. Une rangée de dents internes restent cachées. Pas de dents palatines, ni vomériennes, ni linguales. Des dents pharyngiennes bien développées.

Nageoires — Dorsale à hauteur uniforme, les rayons antérieurs épineux, au nombre de 16 à 18, étant cependant un peu plus petit. 11 à 13 rayons mous articulés, le premier étant simple.

Pectorale, large et courte avec de 16 à 17 rayons.

Anale avec 3 rayons épineux et 11 rayons mous. Sa longueur est égale au 1/6 de la longueur totale.

Ventrale, située un peu en arrière de la pectorale, un rayon épineux et 5 rayons mous. Caudale écaillée à la base, non échancrée.

Ligne latérale — Suit la courbe dorsale et présente 46 à 47 écailles.

Rayons branchiostèges : 5. Dorsale : 16 ou 18 + I/12. Anale : III + 9 à 11. Pectorales : II + 14 ou 15. Ventrals : 1 + 5. Caudale : 11. Vertèbres : 18 + 21. Ligne latérale : 46/47. Lignes transverses : 6/19.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET BIOLOGIE — Présent sur toutes les côtes de l'Europe, sauf Arctique et Mer Baltique. Absent au Finmarck, en Islande et au Groënland.

Vit dans le voisinage de la côte, à proximité des fonds rocheux. Pond d'Avril en Août suivant les régions.

SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE OUVRAGES PRINCIPAUX

1735. — LINNÉ, Syst. Nat., éd. X, p. 286 (*Labrus ossifagus*).
1800. — RETZIUS, Fn. Suéc. Lin, p. 335 (*Labrus exoletus*).
1809. — FABRICIUS, Dan. Vid. Slsk. Skr. 1809-1810, p. 102 (*Labrus speciosus*).
1837. — FRIES à WRIGHT, Skand Fisk. Ed. I, pl. 37-38 (*Labrus dispar*).
1838. — KROYER, Dann. Fiske I, p. 496 et 604 (*Labrus mixtus*).
1855. — NILSSON, Skand. Fn. Fisk, p. 265 (*Labrus mixtus*).
1877. — MALM, Gbgs Boh. Fn., p. 447 (*Labrus mixtus*).
1862. — GUNTHER, Cat. Brit. Fish. Vol. IV, p. 74 (*Labrus mixtus*).
1884. — DAY, Fish Great Brit. Irel. (*Labrus mixtus*).
1881. — MOREAU, Hist. Nat. Pois. France, p. 96, t. III (*Labrus mixtus*).
1892. — SMITT, Hist. Scandinav. Fishes. Part. I p. 10. Pl. II. Fig. 1 et 2. (*Labrus mixtus*).
1913. — LE DANOIS, Pois. Manche Occidentale, p. 63 (*Labrus mixtus*).
Mâle :
1758. — LINNÉ, Syst. nat., éd. X, 287 (*Labrus mixtus*).
1760. — ARTEDI (Walbaum) III, 260 (*Labrus vittatus*).
1767. — ASCANIUS, Icon. 12 (*Labrus coeruleus*).
1788. — GMELIN, Syst. Nat., éd. Gmelin. 1.3.1294 (*Labrus variegatus*).
1810. — RISSO, Ichth. Nice, 220 (*Labrus lineatus*).
Femelle :
1767. — ASCANIUS, loc. cit. (*Labrus cerneus*).
1788. — GMELIN, loc. cit. (*Labrus trimaculatus*).

J. LE GALL 1931.