

Fig. 1. — Roche perforée par les Lithodomes.

DIAGNOSE — Coquille transverse, très allongée, presque cylindrique, à bords dorsal et ventral subparallèles, équivalve, arrondie aux deux extrémités, très inéquilatérale, à région antérieure courte et renflée, à région postérieure plus large et comprimée. Sommets antérieurs, subterminaux ; ligament marginal assez long ; charnière sans dents.

Test peu épais, orné de lignes d'accroissement concentriques et, dans la région médiane seulement, de fines stries serrées, parallèles, presque perpendiculaires ; recouvert d'un épiderme assez luisant, d'un brun fauve uniforme.

Intérieur des valves faiblement nacré, d'un blanc bleuâtre ou jaunâtre.

Diamètre dorso-ventral : 12 à 20 mm. ; diamètre antéro-postérieur : 40 à 60 mm. épaisseur : 10 à 15 mm.




Fig. 2. — Coquille vue du côté gauche (d'après Hidalgo).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Espèce perforante assez commune dans les roches et les blocs de pierre du littoral Méditerranéen; ne vivant pas sur les côtes Atlantiques où sa présence n'a été signalée qu'accidentellement.

Noms vulgaires : Datte de mer, Datte brune.

**BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE,
SYNONYMIE,
OUVRAGES PRINCIPAUX**

1758. — LINNÉ, Systema Naturæ, Ed. X, p. 705 (*Mytilus lithophagus*).
1785. — CHEMNITZ, Conchylien-Cabinet, VIII, p. 147, pl. 82, fig. 730 (*Mytilus lithophagus* L.).
1787. — MEUSCHEN, Museum Geversianum, p. 412 (*Tamarindiformis lithoglyphus*).
1798. — BOLTEN, Museum Boltenianum, p. 156 (*Lithophaga mytiloides*).
1817. — CUVIER, Règne animal, II, p. 471 (*Lithodomus lithophagus* L.).
1823. — SOWERBY, Genera of Shells, *Lithodomus*, fig. 1-2 (*Lithodomus dactylus*).
1857. — REEVE, Conchologia Iconica, X, *Lithodomus*, pl. II, fig. 9 (*Lithodomus lithophagus* L.).
1870. — HIDALGO, Moluscos marinos de España, pl. 26, fig. 9 (*Lithodomus lithophagus* L.).
1882. — DUNKER, Martini u. Chemnitz Conchylien-Cabinet, 2^e Ed., *Lithophaga*, p. 3, pl. 4, fig. 5-6 (*Lithophaga lithoglypha* Meusch.).
1890. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, Mollusques marins du Roussillon, II, p. 160, pl. XXVIII, fig. 12-15 (*Lithodomus lithophaga* L.).
1897. — DAUTZENBERG, Atlas de poche des Coquilles des côtes de France, pl. 40, fig. 136 (*Lithodomus lithophaga* L.).

ED. LAMY