



DIAGNOSE -- Coquille ovoïde-trigone, très renflée, assez mince, équivalve, subéquilatérale, à peine bâillante en arrière ; sommets très saillants.

Surface externe lisse, ornée de stries concentriques d'accroissement.

Dans le *M. corallina* L. (= *lactea* Lk., non Poli) typique, la coloration externe est blanche pellucide avec des fascies concentriques d'un blanc opaque ; dans la variété *stultorum* L., elle est grise avec des zones concentriques violacées, de nombreux rayons fauves et les sommets plus ou moins teintés de rose ou de violet ; dans la variété *atlantica* Bucq. Dautz. Dollf., on trouve le même système de coloration, mais plus terne, et une forme moins renflée, plus transverse, avec sommets moins saillants.

Ligament externe marginal laissant, à son insertion sur chaque valve, une cicatrice séparée, par une lamelle testacée, d'un cuilleron triangulaire profond, dans lequel est logé le ligament interne.

Charnière : dans la valve gauche, deux dents cardinales divergentes soudées à leur partie supérieure, accompagnées, du côté postérieur, d'une très mince lamelle accessoire, dents latérales lamelleuses simples ; dans la valve droite, deux dents cardinales non soudées en haut, dents cardinales lamelleuses doubles.

Intérieur des valves plus ou moins lilas. Impression palléale avec un sinus peu profond, arrondi.

Diamètre umbo-ventral : 35 à 50 mm. ; diamètre antéro-postérieur : 45 à 60 mm. ; épaisseur : 20 à 35 mm.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE -- *M. corallina* typique très commun sur le littoral Méditerranéen ; var. *stultorum* très abondante sur toutes les plages de la Manche, de l'Océan et de la Méditerranée ; var. *atlantica* cantonnée sur les côtes de la Mer du Nord, de l'Océan et de la Manche.

Noms vulgaires : Flie, Fausse palourde, Fausse praire.

BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE
OUVRAGES PRINCIPAUX

1758. -- LINNÉ, Systema Naturae, éd. X, p. 680 (*Cardium corallinum*) et 681 (*Cardium stultorum*).
1767. -- LINNÉ, Systema Naturæ, éd. XII, p. 1125 (*Maetra corallina*) et 1126 (*Maetra stultorum*).
1782. -- CHEMNITZ, Conchylien-Cabinet, VI, p. 226, pl. XXII, fig. 218-219 (*Maetra corallina* L.) et pl. XXIII, fig. 224-226 (*M. stultorum* L.).
1818. -- LAMARCK, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres, V, p. 474 (*M. stultorum* {pars}) et p. 477 (*Maetra lactea* [non Poli]).
1854. -- REEVE, Conchologia Iconica, VIII, *Maetra*, pl. IV, fig. 15 (*M. stultorum* L.) et pl. XI, fig. 50 (*M. corallina* L.).
1870. -- HIDALGO, Moluscos marinos de España, p. 170, pl. XXXI, fig. 1-2 (*M. stultorum* L.).
1896. -- BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, Mollusques marins du Roussillon, II, p. 547, pl. LXXX, fig. 1-5 (*M. corallina* L.), p. 558, pl. LXXX, fig. 6-8 (var. *stultorum* L.), p. 556, pl. LXXXI, fig. 1-3 (var. *oceanica* = *atlantica*).
1897. -- DAUTZENBERG, Atlas de poche des Coquilles des côtes de France, pl. LVI, fig. 185 (*M. corallina* L. var. *stultorum* L.) et 186 (var. *oceanica* B. D. D.).

ED. LAMY 1931.