


Molva elongata

(Risso 1810)


TELEOSTEI
Anacanthini-Gadidae

Molva elongata

(Risso 1810)



1



2

3

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Exemplaire adulte. Original. (Dessin de L. Lorenzetti).

Fig. 2. Stade de 35 mm. D'après Schmidt, fig. 2.

Fig. 3. Stade de 110 mm., de Naples. D'après Schmidt, fig. 4

DIAGNOSE — Corps très allongé, anguilliforme, sub-cylindrique antérieurement, comprimé dans la portion caudale ; hauteur un peu plus grande que l'épaisseur, comprise 11-14 fois dans la longueur totale. Long. jusqu'à 90 cm.

Tête large déprimée ; sa longueur comprend 5 1/2—6 1/2 fois dans la longueur totale. Ouverture buccale très large. Maxillaire étendue presque sous le diamètre vertical de l'œil. Fente buccale un peu plus courte que la moitié de la longueur de la tête. Mandibule proéminente. Mâchoire supérieure avec une large bande de dents pointues très petites, mandibule avec une rangée de fortes dents pointues plus internes. Sur le vomer antérieurement un groupement de grosses dents pointues disposées en demi-cercle. Sous la mandibule court barbillon avec deux rayons, dont l'antérieur plus long. Narines en avant de l'œil, antérieures avec un court tubule. Yeux gros, saillants, allongés en sens horizontal ; leur diamètre horizontal compris 3 1/4—4 1/2 fois dans la longueur de la tête, presqu'égal à l'espace préorbitaire. Fente de l'opercule large. 8 rayons branchiostèges.

Pectorales plutôt étroites, allongées, avec 18 rayons. Ventrals jugulaires, très étroites et longues, plus étendues en arrière que les pectorales ; avec 6 rayons, dont le deuxième plus long, filiforme, contenu presque 8 fois dans la longueur totale. Deux dorsales, dont la première triangulaire plus courte et plus haute, avec 10-12 rayons ; la seconde, longue, étendue de peu en avant de l'anus jusqu'au pédoncule caudal, avec 77-82 rayons. Anale étendue postérieurement jusqu'au niveau de la fin de la dorsale, avec 70-79 rayons. Caudale ovale, allongée, avec 38-45 rayons ; sa longueur est comprise 9-10 fois dans la longueur totale.

Ligne latérale bien distincte. Peau couverte d'écaillles très petites, de couleur gris-rosée pointillée de noir, blanc-grisâtre au ventre. Nageoires grisâtres. Deuxième dorsale et anale postérieurement avec une bande noire et un étroit bord blanc. Caudale noirâtre avec un étroit bord blanc. Péritoine noirâtre.

Les stades jeunes ont dans la région postanale des bandes pigmentées transversales ; ils sont aussi caractérisés par une grande longueur du corps.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée, côtes septentrionales de Nice à la Sicile, Egée. Atlantique, eaux profondes à S. W. de l'Irlande.

SYNONYMIE

Gadus elongatus Otto, *G. molva* Risso, *Lotta elongata* Risso, *Lota molva* Costa, *L. elongata* Bp., *Phycis macrophthalmus* Raf.

BIBLIOGRAPHIE

- 1826. — RISSO, Hist. Nat. Eur. Mérid., T. III, p. 217, fig. 47.
- 1850. — COSTA, Fauna Regno Napoli, Pesci I, pl. 38.
- 1863. — CANESTRINI, Archivio Zool. Anat. Fisiol., T. II, p. 367.
- 1870. — CANESTRINI, Fauna Ital. Pesci, p. 157.
- 1881. — MOREAU, Hist. Nat. Poissons France, T. III, p. 260, fig. 179.
- 1907. — SCHMIDT, Medd. Komm. Havunders. Kjöbenhavn, Fiskeri, Bd. II, n° 8, p. 8, pl. I, fig. 1-4.

U. D'ANCONA — 1931.