



EXPLICATION DES FIGURES

1. Exemplaire de Bar tacheté du lac de Tunis.
2. Parties dentées du maxillaire supérieur, vomer et palatins.

DIAGNOSE — Très semblable à *Morone Labrax* L. mais s'en distingue facilement en ce que le vomer est denté complètement tandis que, chez le Bar commun, le chevron seul l'était ; l'œil est plus grand aussi chez *M. punctata* où, égal à l'espace préorbitaire, il fait le 1/4 environ de la longueur de la tête ; les écailles sont également plus grandes et celles de l'espace interorbitaire sont ici *clénoïdes* alors qu'elles sont *cycloïdes* chez *M. labrax*. La moitié supérieure du corps est en outre ponctuée de taches noires.

La hauteur du corps est comprise 3 fois 1/2 à 4 fois dans la longueur totale, celle de la tête 3 fois à 3 fois 1/2.

Nageoires : D_1 : 9. D_2 : 1/12 ou 13.
A : 3/11 ou 12. P : 16. V : 1/5.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée et côtes atlantiques d'Europe et d'Afrique, de la Normandie à la Sénégal-gambie.

SYNONYMIE & BIBLIOGRAPHIE

1792. — BLOCH, Ausl. Fisch. VI, p. 64, pl. 305 (*Sciaena punctata*).
1802. — LACÉPÈDE, Poissons IV, p. 418 (*Perca punctulata*).
1809. — GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Desc. Egypt., p. 316, pl. XX (*Perca punctata*).
1863. — GUNTHER, An. Mag. Nat. Hist. (3), 12, p. 165 ; BRIT. CAPELLO (1867), Journ. Sc. Lisb. p. 154 ; STEIND (1867), Sitz. Ak. Wien. LVI, I, p. 607 ; MOREAU (1881), Pois. Franc. II, p. 337 ; DODERL (1889), Man. Ittiol. Medit. ; BELLOTTI (1891), Atti Soc. Ital. Sc. Nat. p. 121 (*Labrax punctatus*).
1863. — GUNTHER, loc. cit. (*Labrax orientalis*).
1865. — PETERS. Mon. Berl. Acad. p. 95 (*Labrax Schoenleini*).
1890. — JORDAN & EIGENMANN, Bul. U-S Fish. Com. VIII, p. 425 (*Dicentrarchus orientalis*).
1890. — JORDAN & EIGENMANN, loc. cit. p. 426 (*Dicentrarchus punctatus*).
1895. — BOULENGER, Cat. Fish. p. 131 ; Fish. Nile (1907), Cat. Fr. Fish. Africa III (1915) ; PELLEGRIN, Pois. Afr. N. (1921) ; GRUVEL, Ind. Pêch. Maroc (1923) (*Morone punctata*).

H. HELDT 1931.