



DIAGNOSI — I D. 1/54 — II D. 55 — A. 46 — P. 9 — V. 7 — C. 28

Capo più grosso e muso ben più largo della *Motella comunis*.

Lunghezza del capo contenuta 4 1/2 volte nella lunghezza totale ; altezza del corpo ben minore della lunghezza del capo, eguale alla distanza fra il margine posteriore dell'occhio e quello dell'opercolo ; squarcio orale oltre passante la corrispondenza del margine posteriore dell'occhio ; diametro dell'occhio pochissimo maggiore della metà distanza fra questo e la punta del muso e minore della distanza fra le orbite ; narici della stessa parte, abbastanza distanti fra loro ; l'anteriore con un tentacolo lungo circa due volte il diametro dell'occhio, più vicina alla punta del muso che non all'occhio, la posteriore più vicina a questo che non a quella ; barbiglio mentale più lungo e più robusto dei tentacoli. Due grandissimi canini per parte sugli'infamascellari, dei quali l'esterno più grande ; cinque grandi denti per parte sulla mandibola, dei quali i due anteriori messi più indietro degli altri e di questi l'ultimo molto grande ; denti acuti ricurvi in più serie sul vomero.

I D. con base lunga 1/2 della lunghezza del capo, distante dalla II. D. quanto un diametro dell'occhio, col I raggio lungo quanto detto diametro e gli altri filiformi brevissimi ; II D. poco più dell'A e con raggi più robusti di quelli della I. D. ; P. forti, rotonde, così lunghe che arrivano in corrispondenza della punta del 2. raggio delle V. che hanno il I. raggio in parte libero dal 2. raggio ; C. lunga quanto le P. col margine rotondato.

Colore roseo-bruno, più intenso sulle pinne, le quali hanno il margine rosseggiante ; macchie bruno-scure sul capo, corpo e pinne, meno che sull'A. che ha la parte basiliare chiara e rosseggiante la terminale.

Abita questa specie le grandi profondità del mare intorno Spalato (Dalmazia).

BIBLIOGRAFIA

1903. — KOLOMBATOVIC G. Contribuzioni alla fauna dei vertebrati della Dalmazia. 1903. (in "Glasnika Hrv. Naravoslovnoga Drustva" God XV).

E. NINNI—1929.