

TELEOSTEI

Acanthopterygii-Percesoces

Mugil labrosus

(Risso 1826)




Fig. 1. L'animal vu de profil, réduit de moitié. DAY, Fish Gr. Br. a Irel. I, pl. LXVII, 1880-84.




Fig. 2. Tête, face inférieure, montrant l'espace jugulaire presque nul. LE DANOIS, Contribution à l'étude systématique et biologique des Poissons de la Manche occidentale, p. 54, fig. 82, 1913.

DIAGNOSE — Dorsales IV, 9, Anale III-9, Caudale 16, Pectorales 17, Pelviennes 1-5 rayons. Ligne latérale 45 à 46 écailles, ligne transversale 15 à 16. Rayons branchiostèges 6. Cœcums pyloriques 6 ou 7. Vertèbres 11/13.

Hauteur du corps contenue de 4 fois $\frac{2}{3}$ à 5 fois dans la longueur totale ; longueur de la tête 5 fois $\frac{1}{2}$ dans la longueur totale. Museau court, obtus. Espace interorbitaire faiblement convexe, sa longueur faisant à peu près la moitié de la longueur de la tête. Lèvre supérieure épaisse, à bord garni de cils courts et raides. Les mandibulaires forment, en se rejoignant, un angle obtus. Maxillaires recouverts en partie seulement par les sous-orbitaires. Espace jugulaire presque nul (fig. 2). Pas de paupières adipeuses. Diamètre oculaire contenu de 5 à 6 fois dans la longueur de la tête et 2 fois à 2 fois $\frac{3}{4}$ dans l'espace interorbitaire. Premier sous-orbitaire à bord externe taillé obliquement, angle antérieur obtus et angle postérieur aigu. Narine antérieure plus près de l'orbite que du museau. 1^e Dorsale plus haute que longue, ses 2 premiers rayons faisant plus de la moitié de la longueur de la tête. 2^e Dorsale plus haute que longue, et à peu près aussi haute que la

première. Ecaille axillaire de la Pectorale mousse et courte. 13^e, 14^e ou 15^e, et 26^e ou 27^e écailles de la ligne latérale correspondant respectivement à l'extrémité des Pectorales et à l'origine de chacune des Dorsales. Base de la Pectorale située un peu au dessus du milieu du corps. Pelviennes insérées à mi-chemin des Pectorales et de la 1^{re} Dorsale.

Iris jaunâtre. Dos gris-bleuâtre, ainsi que les flancs, qui portent 6 ou 7 bandes d'un brun parfois jaunâtre.

Ventre argenté. Pectorales jaunâtres, avec une tache foncé à la partie supérieure de leur base.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

Méditerranée. Atlantique (de la Mer du Nord aux Canaries).

BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE,

OUVRAGES PRINCIPAUX

1809. — DE LA ROCHE. *Mugil cephalus*, Var. B.. *Ann. Mus.*, XIII, p. 358, Tab. 21, fig. 7.
1810. — RISSO. *Mugil provensalis* (excl. var. A), *Ichth. Nice*, p. 346.
1826. — RISSO. *Mugil labrosus*, *Eur. Mérid.*, III, p. 389.
1829. — CUVIER. *Mugil chelo*, *Règne Anim.*, 2^e éd., II, p. 232.
1832-41. — BONAPARTE. *Mugil chelo*, *Faun. Ital. Pesc.*, p. 89, Pl 91, fig. 2.
1836. — CUVIER ET VALENCIENNES. *Mugil chelo*, *Hist. Nat. Poiss.*, XI, p. 50, Pl. 309.
1839. — LOWE. *Mugil corrugatus*, *Trans. Zool. Soc.*, II, p. 184.
1840. — NORDMANN. *Mugil chelo*, in *Demid. Voy. Russ. Mérid.*, III, p. 395.
1850. — GUICHENOT. *Mugil chelo*, *Expl. Alg. Poiss.*, XI, p. 50, pl. 309.
1861. — GÜNTHER. *Mugil chelo*, *Cat. Acanth. Fish. Brit. Mus.*, III, p. 454.
1861. — GÜNTHER. *Mugil septentrionalis*, *op. cit.*, p. 455.
1881. — MOREAU. *Mugil chelo*, *Hist. nat. Poiss. Fr.*, III, p. 195.
1881. — DAY. *Mugil chelo*, *Fish. Gr. Brit. a. Irel.*, p. 232, Pl. LXVII.
1893. — SMITT. *Mugil chelo*, *Scand. Fish. I.*, p. 334, Pl. XL, fig. 11.
1916. — BOULENGER. *Mugil chelo*, *Cat. Fresh-wat. Fish. Afr. Brit. Mus. IV.* p. 89-90. Fig. 52.
1924. — JOUBIN ET LE DANOIS. *Mugil chelo*, *Mém. Of. Pêches Marit.*, I, p. 47 et fig.

P. CHEVEY