


## TELEOSTEI

*Acanthopterygii-Percesoces*

# Mugil ramada

(Risso 1826)



**DIAGNOSE** — Dorsales IV, 1/7 ou 8, Anale III - 8 ou 9, Caudale 17, Pectorales 17, Pelviennes I - 5 rayons.

Ligne latérale 44 à 46 écailles, ligne transversale 14 à 15.

Rayons branchiostèges 6. Cœcums pyloriques 6 à 7. Vertèbres 12/12.

Hauteur du corps contenue de 5 fois à 5 fois 1/3 dans la longueur totale, longueur de la tête 4 fois 1/2 dans la longueur totale.

Museau court, gros, à bord antérieur formant un angle obtus. Espace interorbitaire faiblement convexe, sa largeur étant contenue de 2 fois 1/2 à 2 fois 2/3 dans la longueur de la tête. Lèvre supérieure bordée de cils extrêmement fins. Les mandibulaires forment en se rejoignant, un angle plutôt obtus.

Maxillaires recouverts en partie seulement par les sous-orbitaires.

Espace jugulaire ovale, environ 2 fois 1/2 plus long que le diamètre oculaire. Pas de paupières adipeuses. Diamètre contenu de 4 fois 1/2 à 6 fois dans la longueur de la tête, et 2 fois 1/2 ou plus dans l'espace interorbitaire. Bord antérieur du sous-orbitaire en partie dentelé, droit, sans échancrure arrondie. Narines rapprochées l'une de l'autre.

1<sup>re</sup> Dorsale plus haute que longue, ses deux premiers rayons faisant environ la moitié de la longueur de la tête. 2<sup>e</sup> Dorsale aussi haute, ou plus haute que la première. Ecaille axillaire de la Pectorale allongée, moins que dans le *M. cephalus*. 8<sup>e</sup> ou 9<sup>e</sup>, 12<sup>e</sup> ou 13<sup>e</sup>, et 24<sup>e</sup> ou 25<sup>e</sup> écailles de la ligne latérale correspondant respectivement à l'extrémité des Pectorales et à l'origine de chacune des Dorsales. Base de la Pectorale située au dessus du milieu du corps. Pelviennes insérées à mi-chemin des Pectorales et de la 1<sup>re</sup> Dorsale.

Iris argenté, avec souvent 2 taches jaunâtres en avant. Dos brunâtre, flancs grisâtres, avec 6 ou 7 bandes longitudinales brunâtres. Ventre gris argenté. Dorsales et Caudale gris-brunâtres plus ou moins foncées ainsi que la Pectorale dont l'angle supérieur montre presque toujours une tache noire se prolongeant même sur sa base. Anale grisâtre. Pelviennes blanchâtres.

### DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

Méditerranée (jusqu'en Egypte). Atlantique (depuis la mer du Nord). Cap de Bonne Espérance, d'après GÜNTHER.

## EXPLICATION DE LA FIGURE

L'animal vu de profil, réduit de moitié, DAY, Fish. Gr. Brit. a. Irel; I. pl. LXVI.

### BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE, OUVRAGES PRINCIPAUX

1802. — DONOVAN. *Mugil cephalus*, (non Linné), Brit. Fish. I. pl. XV.  
1810. — RISSO. *Mugil cephalus*, var. A., Ichth. Nice, p. 344.  
1826. — RISSO. *Mugil ramada*, Eur. Mérid., III., p. 390.  
1829. — CUVIER. *Mugil capito*, Règne Anim., 2<sup>e</sup> édit., 2, p. 232.  
1830. — HANCOCK. *Mugil britannicus*, Lond. Quart. Journ. Sc., p. 129.  
1832-41. — BONAPARTE. *Mugil capito*, Faun. Ital. Pesc., p. 93, Pl. 92, Fig. 1.  
1836. — CUVIER ET VALENCIENNES. *Mugil capito*, Hist. nat. Poiss., XI, p. 36, Pl. 308.  
1836. — CUVIER ET VALENCIENNES. *Mugil Dubahra*, op. cit., p. 60.  
1846. — SMITH, *Mugil capensis* (non C. et V.), Ill. Zool. S. Afr., Fish., Pl. XXX, fig. 1.  
1850. — GUICHENOT. *Mugil capito*, Expl. Alg., Poiss., p. 67.  
1855. — NILSSON. *Mugil capito*, Skand. Faun., IV, p. 176.  
1861. — CASTELNAU. *Mugil smithii*, Mém. Poiss. Afr. Austr., p. 46.  
1861. — GÜNTHER. *Mugil capito*, Cat. Acanth. Fish. Brit. Mus., III, p. 439 et *Ann. Mag. N. H.* (3), VII, p. 346.  
1861. — GÜNTHER. *Mugil octo-radiatus*, (part.) Cat. Acanth. Fish. Brit. Mus. III, p. 437.  
1861. — GÜNTHER. *Mugil petherici*, op. cit., p. 441.  
1881. — MOREAU. *Mugil capito*, Hist. Nat. poiss. Fr., III, p. 188.  
1881. — DAY. *Mugil capito*, Fish. Gr. Brit. a. Irel., p. 230, Pl. LXVI.  
1883. — LORTET. *Mugil capito*, Arch. Mus. Lyon, III, p. 131, Pl. X, fig. 2.  
1883. — LORTET. *Mugil octoradiatus*, op. cit., p. 133, Pl. XI, fig. 2.  
1883. — LORTET. *Mugil curtus* (non Yarrell), op. cit., p. 132, Pl. XI, fig. 1.  
1883. — LORTET. *Mugil auratus* (non Risso) op. cit., p. 134, Pl. XI, fig. 3.  
1893. — SMITT. *Mugil capito*, Scand. Fish. H., I. p. 339, et fig.  
1903. — FOWLER. (*Liza alosoides* ?), Proc. Ac. Philad., LV, p. 746, Pl. XLV.  
1907. — BOULENGER. *Mugil capito*, Fish. Nile, p. 432, PL. LXXX, fig. 2, and Pl. LXXXI, fig. 1.  
1916. — BOULENGER. *Mugil capito*, Cat. Fresh-Wat. Fish. Afr. Brit. Mus., IV, p. 83, fig. 49.  
1924. — JOUBIN ET LE DANOIS. *Mugil capito*, Mém. Off. P. marit., I, p. 49.  
1925. — ROULE. *Mugil ramada*, Poiss. Eaux douces de France, p. 50, fig. 21 et 21 A.

P. CHEVEY