



DIAGNOSE — Corpo allungato, ricoperto di squame piuttosto grandi cicloidi anche sulla testa e sui pezzi opercolari.

L'altezza del tronco sta cinque volte e mezzo nella lunghezza totale del pesce. Muso appuntito, la lunghezza della testa sta 4 1/2 volte nella lunghezza totale., ed il suo profilo superiore forma quasi una linea retta con quello del dorso. La narice posteriore è di forma semilunare, quella anteriore è rotonda.

Occhio grande non ricoperto da strato adiposo, il suo diametro sta 4 1/2 volte nella lunghezza della testa.

Lo squarcio della bocca è piccolo, obliquo, la porzione estrema del mandibolare superiore sporge fuori dal preorbitale. Lo spazio iugulare è lungo, stretto e continuato.

La linea laterale, difficilmente visibile, contiene 44 squame, in quella trasversale se ne contano 15.

La prima dorsale è composta da 4 raggi spinosi, forti, il primo è il più lungo. La perpendicolare calata da questo raggio cade molto all'indietro della punta dell'appendice scagliosa, detta pinna sta due volte nell'altezza del tronco del pesce. La seconda dorsale, posta molto all'indietro, conta 8-9 raggi, è quasi alta come la prima. La codale bene sviluppata è composta da 14 raggi (Bonap. ne assegna 17). L'anale sta sotto la seconda dorsale, ha 3 raggi spinosi di cui il primo metà lungo del secondo e, 9 raggi molli. Ventrali con un raggio spinoso molto forte e 5 di molli. L'appendice scagliosa non oltrepassa la base posteriore di detta pinna. Pettorali con 15 raggi, esse sono poste a metà altezza del tronco, sono piuttosto corte e non oltrepassano il margine posteriore delle ventrali.

COLORAZIONE — Il dorso è più o meno color d'ardesia sbiadendo sensibilmente verso i fianchi fino a divenire completamente bianco sulle parti ventrali. Non esiste macchia nera sulla base delle pettorali. Sui pezzi opercolari vi sono due o tre macchie di un bel giallo dorato. Le pinne sono azzurrognole ad eccezione della prima dorsale e delle pettorali che sono giallastre. Lungo i fianchi scorrono 5 a 6 linee longitudinali grigio azzurre, talvolta poco distinte, specialmente l'ultima.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA — Vive in tutto il Mediterraneo. E' oltremodo abbondante nell'alto Adriatico, nel Mar Egeo, Mar di Marmara e Bosforo.

BIBLIOGRAFIA

1810. — RISSO, *Icht. Nice*, p. 345.
1826. — RISSO, *Hist. Nat. III*, p. 391.
1828. — CUVIER ET VALENCIENNES, *Hist. Nat. Poiss. XI*, p. 47.
1832. — BONAPARTE, *Icon. Fau. Ital.* p. 37.
1850. — GUICHENOT, *Explor. Alger*, p. 67.
1872. — CANESTRINI, *Fauna d'Ital.*, p. 114.
1881. — MOREAU, *Hist. Natur. Poiss. de la Fran. III*, p. 191.
1912. — NINNI E., *Cat. Pesci Adr.*, p. 132.
1926. — DE BUEN F., *Manual. Ict. Espan.*, p. 70.

E. NINNI 1932.