


TELEOSTEI

*Mullidæ*

# **Mullus surmuletus**

(LIN.)



**DIAGNOSE** — Corpo allungato, compresso soltanto ai fianchi, ricoperto da grandi squame caduche. L'altezza del tronco sta 4 1/2 volte nella lunghezza totale del pesce.

Testa grande, più lunga che alta, essa sta oltre 4 volte nella lunghezza del corpo. Il suo profilo scende dolcemente verso l'apice del muso. Bocca piccola, poco obliqua, il suo squarcio non arriva a metà lunghezza fra l'apice del muso ed il margine anteriore dell'occhio. Negli esemplari adulti esistono dei piccoli denti nella mascella inferiore e sul vomere. I cirri posti sotto la mascella inferiore arrivano fino all'incurvatura dell'opercolo. Occhio grande e posto in alto, il suo diametro è compreso 3 1/2 volte nella lunghezza della testa.

Pezzi opercolari con i margini interi, guancie non corazzate. Linea laterale alquanto vicina a quella del dorso fino all'inserzione della seconda dorsale, quivi discende e prosegue in linea retta fino al peduncolo codale. Lungo la medesima vi si contano 39 a 40 squame e, su quella trasversale 11.

Prima dorsale alta con 8 raggi spinosi di cui il primo assai corto, il secondo è il più alto, i rimanenti diminuiscono gradatamente. Seconda dorsale con 9 raggi ed è più bassa della prima. Codale foreuta con 18 raggi. L'anale conta 1 raggio elastico e 7 di molli ed è opposta alla seconda dorsale ma più breve. Pettorali brevi con 17 raggi, ripiegate raggiungono l'ultimo raggio della prima dorsale. Ventrali con 1 raggio spinoso e 5 di molli, esse sono opposte alle pettorali.

**COLORAZIONE** — Il colore fondamentale è rosso o rosso vermiglio, lungo i fianchi scorrono quattro fasce gialle. Il dorso è verdastro in taluni esemplari bruno. Testa e guancie vermiglie, le parti inferiori del corpo sono rosa pallido o giallognole.

**DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA** — Vive ed è comune in tutto il bacino del Mediterraneo ed ama le posizioni di scoglio a differenza del *Mullus barbatus*. La si trova anche lungo le coste del Portogallo, Spagna, Francia fino a quelle dell'Inghilterra.

**Mullus surmuletus** (LIN.)

## BIBLIOGRAFIA

1554. — SALVIANI, *Mullus*. Aq. Anim. pag. 235.  
1756. — LIN., *Mullus surmuletus*, Syst. nat. pag. 496.  
1783. — BLOCH, *Mullus surmuletus*, Naturges. tav. 57.  
1810. — RISSO, *Mullus surmulettus*, Ich. Nice pag. 213.  
1830. — CUV. VAL., *Mullus surmuletus*, Hist. Poiss. III pag. 433.  
1859. — GÜNTH, *Mullus surmuletus*, Cat. Fish. I. pag. 401.  
1872. — CANESTR. *Mullus surmuletus*, Faun. Ital. pag. 72.  
1881. — MOREAU, *Mullus surmuletus*, Poiss. de France II, pag. 244.  
1912. — NINNI E., *Mullus surmuletus*, Cat. Pes. Adriat. pag. 28.  
1926. — DE BUEN F., *Mullus surmuletus, forma barbatus*, Cat. Ich. Med. Espan. Pag. 144.

E. NINNI — 1931.