



DIAGNOSE — Coquille claviforme, ventrue, à spire surbaissée, formée de sept à huit tours, couverts de fines stries transversales et munis chacun de six à sept varices aplaties, tantôt présentant de simples tubercules gros et courts, tantôt armées d'épines canaliculées grêles et longues : les premiers tours sont alors surmontés d'une seule rangée de ces épines, tandis que le dernier en porte deux rangs ; il se termine par un canal étroit très allongé, qui est pourvu, vers sa partie supérieure, d'une série d'épines obliques.

Ouverture grande, ovale : labre mince et denticulé ; bord columellaire d'abord adhérent, puis se relevant en une mince lamelle.

Coloration externe jaunâtre ; ouverture teintée de roux-orangé.

Opercule corné, ovale, concentrique, à nucléus subapical.

Hauteur : 50 à 90 millimètres, largeur : 20 à 45 millimètres.

Dans la forme typique, la plus fréquente, le dernier tour possède deux rangs d'épines ; mais parfois, ou bien il en porte, entre ceux-ci, une troisième rangée (var. *trifariospinosa* Frauenfeld), ou bien il ne présente plus que les épines du rang supérieur (var. *coronata* Risso).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Méditerranée : fonds vaseux, à une profondeur variant de 10 à 30 mètres ; également côte occidentale d'Afrique.

Noms vulgaires : Rocher massue, droite épine, biou harpu.

Le *M. brandaris* est la coquille munie d'un bec et de sept pointes (*rostro et aculeis septenis*) qui est appelée *Purpura* par Pline et l'animal fournit une matière colorante d'un carmin plus ou moins foncé.

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Fig. 1. L'animal, grandeur naturelle, face dorsale.

Fig. 2. L'animal, grandeur naturelle, face ventrale.

BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE, OUVRAGES PRINCIPAUX.

1758. — LINNÉ, *Systema Naturæ*, ed. X, p. 747. (*Murex brandaris*).
1777. — MARTINI, *Conchylien Cabinet* III, p. 372, pl. 114, fig. 1058-1061. (*Haustellum nodosospinosum*).
1845. — REEVE, *Conchologia Iconica*, III, *Murex*, pl. 23, fig. 96. (*Murex brandaris* L.).
1870. — HIDALGO, *Moluscos marinos de España*, pl. 11, fig. 7-8, pl. 12, fig. 3-4 et pl. 13, fig. 1. (*Murex brandaris* L.).
1882. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, *Mollusques marins du Roussillon*, I, p. 17, pl. 1, fig. 1-2. (*Murex brandaris* L.).
1897. — DAUTZENBERG, *Atlas de poche des Coquilles des côtes de France*, pl. 7, fig. 30. (*Murex brandaris* L.).

ED. LAMY