



**DIAGNOSE** — Coquille allongée, subquadrangulaire, plus ou moins déprimée, équivalve, à bord ligamentaire court, formant un angle, bien marqué et situé très haut, à sa jonction avec le bord dorsal, qui est presque parallèle au bord ventral. Sommets terminaux, très aigus et recourbés. Test assez épais, orné de nombreuses et fines stries d'accroissement. Epiderme très adhérent, plus ou moins luisant. Coloration externe d'un noir uniforme passant au roux-ferrugineux dans le voisinage des sommets et dans la région ventrale. Ligament interne peu épais. Charnière pourvue de trois ou quatre petites denticulations. Intérieur des valves gris-bleuâtre avec zone périphérique noirâtre et région umbonale d'un blanc opaque. Diamètre umbono-ventral : 40 à 50 mm. ; diamètre antéro-postérieur : 70 à 80 mm. ; épaisseur : 28 à 30 mm.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE** — Ce Mollusque, commun dans la zone littorale, vit plus spécialement dans la Méditerranée, bien que certaines de ses variétés existent aussi sur les côtes Atlantiques.

**BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, SYNONYMIE,  
OUVRAGES PRINCIPAUX**

1819. — LAMARCK, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, VI, 1<sup>re</sup> p., p. 126 (*Mytilus galloprovincialis*).
1857. — REEVE, Conchologia Iconica, X, *Mytilus*, pl. IX, fig. 39 (*M. galloprovincialis* Lk.).
1870. — HIDALGO, Moluscos marinos de España, p. 127, pl. 25, fig. 2 et 4 (*M. edulis* L. [pars]).
1889. — BUCQUOY, DAUTZENBERG, DOLLFUS, Mollusques marins du Roussillon, II, p. 133, pl. XXV, fig. 1-13.
1897. — DAUTZENBERG, Atlas de poche des Coquilles des côtes de France, pl. 39, fig. 133 (*M. galloprovincialis* Lk.).

ED. LAMY 1929