



*Naucrates ductor.* (CUVIER et VALENCIENNES. Loc. cit. Pl. 232).

**CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.** — (Genre *Naucrates*, RAFINESQUE).

Corps oblong, peu comprimé, couvert de petites écailles. Ouverture de la bouche modérée. La dorsale épineuse est réduite à quelques faibles épines, basses, non réunies par une membrane chez l'adulte. Une carène de chaque côté du pédoncule caudal. Ventrals thoraciques.

Dents villiformes sur les mâchoires, le vomer et les palatins.

**CARACTÈRES SPÉCIFIQUES.** — Corps oblong, légèrement allongé, peu comprimé, la hauteur étant comprise 4 fois dans la longueur totale qui va de 50 à 70 centimètres chez l'adulte.

**Coloration.** — Bleuâtre avec de 5 à 7 bandes verticales noires ; 2 ou 3 d'entre elles allant de la nageoire dorsale à l'anale. Le bord externe de la caudale, celui des ventrals, des pectorales sont noirs.

**Tête.** — Longueur égale au 1/4 de la longueur totale. Museau obtus. Bouche terminale, plutôt petite et oblique. Yeux situés en avant, petits, leur diamètre est compris 5 fois 1/2 dans longueur de la tête. Le maxillaire atteint et dépasse légèrement la verticale, passant par le bord antérieur de l'œil.

Dents villiformes sur les mâchoires, le vomer et les palatins.

Les jeunes présentent une épine assez forte dans l'angle de l'opercule.

**Nageoires.** — *Dorsales.* La première dorsale est réduite à 4 ou 5 épines très faibles qui, chez le jeune, sont réunies par une membrane. La deuxième a le bord légèrement concave et débute vers la moitié de l'espace compris entre le bout du museau et l'origine de la caudale. 26 à 28 rayons mous. *Anale* similaire mais plus courte avec 16 à 17 rayons mous précédés par 2 très courtes épines. Une carène caudale charnue, nettement marquée. *Caudale* grande et bien fourchue. *Pectorales* courtes et larges. *Ventrals* aussi grandes.

Rayons branchiostèges : VII.

Dorsales D. 1 = IV ou V. D. 2. = I + 26 à 28.

Anale : II + I + 16 à 18.

Cæcums pyloriques : 15 ou 16.

Vertèbres : 10 + 16.

**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. BIOLOGIE.** — Poissons pélagiques très largement distribué dans les mers ouvertes tropicales et tempérées. Méditerranée (Le Pilote.)

**SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, OUVRAGES PRINCIPAUX**

1758. — LINNÉ. Syst. Nat. Ed. X. 295. (*Gasterosteus ductor*.)  
1802. — LACÉPÈDE. Hist. Nat. Poiss. III, 311. (*Centronotus conductor*.)  
1810. — RAFINESQUE. Caratteri. 45. (*Naucrates fanfarus*.)  
1831. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poiss. VIII, 239. (*Naucrates noveboracensis*)  
1831. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poiss. VIII, 312, pl. 232. (*Naucrates ductor*.)  
1833. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poiss. IX, 162. (*Seriola dussumieri*.)  
1833. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poiss. IX, 163. (*Seriola succincta*.)  
1833. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poiss. IX, 185, pl. 263, fig. 1. (*Neuclerus abbreviatus*.)  
1833. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poiss. IX, 187. (*Naucclerus brachycentrus*.)  
1833. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poiss. IX, 188. (*Naucclerus tricanthus*.)  
1833. — CUVIER et VALENCIENNES. Hist. Nat. Poiss. IX, 189. (*Naucclerus annularis et Naucclerus lecurus*.)  
1839. — SWAINSON. Classif. Fishes. II, 412. (*Naucrates cyanophrys et Naucrates serratus*.)  
1844. — RICHARDSON. Voy. Erebus and Terror. 52. (*Xystophorus*.)  
1854. — GRONOW. Cat. Fishes. (*Thynnus pompilus*.)  
1860. — GUNTHER. Catalogue, p. 374. (*Naucrates ductor*.)

Jean LE GALL, 1933.