



EXPLICATION DE LA PLANCHE

Individu adulte de 1.085 millimètres. Capturé par le DANA.
ROULE et BERTIN, pl. I, fig. 5.

DIAGNOSE — Corps excessivement allongé. Museau en forme de bec grêle, faisant plus de la moitié de la longueur céphalique, et brusquement rétréci en avant des yeux (*bec scolopaciforme*). Toutes les *dents* très petites et pointues, disposées en lime. Tronc débutant immédiatement en arrière de la tête par une région collaire étroite et se terminant par un long *filament caudal*. Fentes branchiales amples mais nettement séparées l'une de l'autre sous la gorge. *Ligne latérale* composée de trois rangées de petits pores alternant de manière à dessiner une série d'hexagones sur chaque flanc. *Pectorales* bien développés. *Dorsale* s'étendant depuis le dessous de la tête jusqu'à l'extrémité du filament caudal et comprenant une région médiane pseudo-épineuse. *Anale* commençant immédiatement en arrière de l'anus, sous les pectorales, et se continuant jusqu'au bout du filament caudal.

COLORATION — Ventre et flancs d'un brun noirâtre ; dos plus clair ; tête jaunâtre pointillée de brun ; iris bleu clair ; pectorales jaunâtres ; dorsale et anale presque noires.

NOMBRE DE VERTÈBRES : 350 à 550 chez sept exemplaires.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE — Moyennes profondeurs des océans, principalement dans la zone intertropicale. Quelques spécimens pris dans l'Atlantique nord (Açores, La Rochelle) et en Méditerranée (Toulon, Nice, Gênes).

PRINCIPAL OUVRAGE A CONSULTER

1929. — ROULE et BERTIN. Les poissons apodes appartenant au sous-ordre des Némichthydiformes. *The Danish « Dana ». Expéditions 1920-1922, Reports, n° 4.* (Cet ouvrage contient une bibliographie complète.)

ROULE et BERTIN — 1931.