



Figure d'après CANESTRINI 1862. Pl. XV-XVI, fig. 2.

DIAGNOSE. — Corps allongé, comprimé dans la partie caudale, long de 45 centimètres et plus. Hauteur comprise cinq fois et demie à six fois et demie dans la longueur totale.

Tête large, déprimée ; sa longueur comprise cinq fois et demie dans la longueur totale. Museau court, large, déprimé. Bouche grande arquée, étendue jusqu'au niveau de la marge postérieure de l'œil. Mâchoire supérieure proéminente. Les deux mâchoires pourvues de lèvres charnues, avec une bande assez large de petites dents presque égales. Œil rond ; son diamètre faisant la moitié ou presque de l'espace préorbitaire, presque égal à l'espace interorbitaire ou même plus grand ; dans les grands exemplaires il fait $1/4-1/6$ de la longueur de la tête. Narines antérieures et postérieures voisines, en avant des yeux, situées environ au milieu de l'espace préorbitaire ; narines antérieures pourvues d'un tentacule long d'environ une fois et demie le diamètre de l'œil ; les postérieures entourées d'un petit tube. Barbillion au milieu de la mâchoire inférieure, long d'environ deux fois le diamètre de l'œil. Fentes branchiales grandes ; les deux membranes branchiostèges s'unissent ventralement.

Première dorsale basse enfoncée dans un sillon du dos, commençant en avant de la marge postérieure de l'opercule ; à peu près aussi longue que l'espace postorbitaire ou un peu plus, constituée par des rayons mous tentaculaires libres, dont le premier est sensiblement plus long. Seconde dorsale normale, longue, commençant un peu en arrière de la terminaison des pectorales, s'étendant, avec la même hauteur, jusqu'au pédoncule caudal où elle se termine en un lobe arrondi. Anale, semblable à la seconde dorsale, étendue aussi jusqu'au pédoncule caudal et se terminant, symétriquement à celle-là, en un lobe arrondi. Seconde dorsale avec 52-62 rayons, anale avec 42-55. Anus à peu près au $2/5$ de la longueur totale. Caudale à marge postérieure arrondie, avec 22-26 rayons. Pectorales allongées, avec 15-17 rayons. Ventrales jugulaires avec 6 rayons, dont le second, plus long, ne dépasse pas la marge postérieure des pectorales. Vertèbres 15 + 33.

Tout le corps est couvert d'écailles très petites, lisses. Ligne latérale non distincte.

Couleur brune plus ou moins foncée, quelquefois semée de taches brunes, d'autres fois uniforme, souvent avec des taches blanchâtres. Ventre blanc grisâtre. Seconde dorsale et anale brunes, plus foncées vers la marge et particulièrement vers la partie postérieure, avec un liseré blanc.

Jeunes pélagiques à dos bleu, à ventre argenté.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Côtes européennes de l'Atlantique, Méditerranée, commun.

SYNONYMIE. — *Onos maculatus* Risso, *O. fuscus* Risso, *Motella maculata* Costa, *M. macrophthalma* Gthr., *M. fusca* Bp., *M. mediterranea* Bp., *M. communis* Costa ? *Blennius lupus* Raf.

BIBLIOGRAPHIE

- 1841-46. — COSTA, Fauna Regno Napoli, Pesci, Pl. XXXVIII bis.
1859-70. — GUNTHER, Cat. fishes Brit. Mus., IV, p. 366.
1862. — CANESTRINI, *Arch. Zoologia, Anat.*, etc., T. II, p. 369, pl. XV-XVI, fig. 2.
1870-74. — CANESTRINI, Fauna d'Italia, Pesci, p. 158.
1881. — MOREAU, Poissons de la France, III, p. 270.
1889-93. — CARUS, Prodrömus faunae medit., II, p. 578.
1905-09. — EHRENBAUM, Eier u. Larven Fischen Nord. Plankton, p. 277.
1929. — D'ANCONA, *Pubbl. Staz. Zool. Napoli*. IX, p. 457.

UMBERTO D'ANCONA, 1933.