


TELEOSTEI
Acanthopterygii
Perciformes - Sparidæ

Orthopristis (Pristipoma) Bennetti

LOWE.



Orthopristis (Pristipoma). BENNETTI.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. — Genre *Orthopristis* (GIRARD, 1859).

Sparidæ ayant toutes les dents canines, absentes sur le vomer et les palatins. Pas de fortes canines. Prémaxillaires peu protractiles. Vessie natatoire simple.

Un sillon central est visible en arrière de la symphyse mandibulaire.

Bouche plutôt petite. Dorsale et anale sans écaille, basses. Préopercule dentelé. Branchiospines de taille moyenne.

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES. — Corps comprimé, courbure dorsale assez prononcée. Profil antérieur concave et déprimé au-dessus des yeux. Hauteur du corps comprise 3 fois $\frac{2}{3}$ dans la longueur totale. Ecailles grandes, disposées en séries obliques jusqu'au dernier tiers de la dorsale, horizontales postérieurement.

Coloration. — Grisâtre dorsalement, argentée ventralement. Le bord de l'opercule est nettement bordé de noir.

Tête comprise 3 fois $\frac{1}{3}$ dans la longueur totale. Museau court assez pointu. Yeux grands : diamètre 3 fois $\frac{3}{4}$ dans longueur de la tête. Préorbitaire étroit : sa longueur est contenue plus de 5 fois dans la longueur de la tête. Préopercule finement denticulé.

Mâchoires sensiblement égales. Les dents de la rangée externe sont un peu plus fortes que les autres.

Rayons branchiostèges petits et grêles.

Nageoires. — **Dorsale** : basse ; rayons épineux frêles ; le dernier étant à peine égal à la moitié du 1^{er} rayon mou, qui est plus grand que les rayons mous suivants. **Anale** basse, au bord concave. Le 2^e rayon épineux de l'anale est de même longueur que le 3^e mais plus fort. Le 1^{er} rayon mou a la même longueur que ces 2 rayons épineux.

Pectorales longues. *Caudale* fourchue : le lobe supérieur est plus grand.

Ligne latérale : 7 + 49 + 13.

Rayons branchiostèges : VII.

Dorsale : XII + 15. Anale : III + 11 à 13.

Pectorales : 16. Ventrales : I + 5.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. BIOLOGIE. — Côte Sud d'Espagne. Côte Nord-Ouest de l'Afrique et îles avoisinantes. Méditerranée (rare).

SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, OUVRAGES PRINCIPAUX

1841. — LOWE. Trans. Zool. Soc. II. 176. (*Pristipoma Bennetti.*) Madère.
1835. — VALENCIENNES. Hist. Nat. Canaries. (*Pristipoma renchus.*) Iles Canaries.
1881. — STEINDACHNER. Fische Afrika, p. 9. (*Pristipoma Bennetti.*) Gorée.
1891. — D. S. JORDAN et B. FESLER. Rev. Sparoid Fishes America and Europe. (*Orthopristis Benetti.*)
1927. — CHABANAUD et Th. MONOD. Poissons Port-Etienne, p. 42. (*Pristipoma Bennetti.*)
A. VALENCIENNES. In. P. B. Webb et S. Berthelot. Ichthyologie des Iles Canaries, pl. 7, fig. 2. (*Pristipoma renchus.*)

Jean LE GALL, 1933.