


TELEOSTEI
Acanthopterygii
Perciformes - Sparidae

Pagellus acarne

(Risso 1827)



DIAGNOSE GÉNÉRIQUE —

Sparidae aux joues écailleuses, aux dents antérieures cardiformes, généralement plus fortes sur la rangée externe. Molaires latérales. Pas de canines, pas de dents vomériennes, pas de dents palatines. La portion épineuse de la nageoire dorsale peut s'effacer dans un sillon dorsal écailleux. Trois épines anales. Six rayons branchiostèges. Vessie natatoire simple.

DIAGNOSE SPÉCIFIQUE —

Corps — Oblong, couvert d'écailles assez grandes, au bord postérieur garni de spinules. La hauteur du corps est contenue trois fois $1/4$ à 3 fois $2/3$ dans la longueur totale qui atteint chez l'adulte de 25 à 35 centimètres.

Coloration — Rouge avec des reflets dorés. Une tache triangulaire brunâtre nettement marquée à l'aisselle de la pectorale.

Tête — Au profil antérieur arrondi, museau obtus. La longueur de la tête est plus grande que sa hauteur. Elle reste comprise trois fois $1/2$ à 4 fois dans la longueur totale. Cinq séries d'écailles sur les joues entre le préorbitaire et le bord du préopercule.

Le diamètre de l'œil est sensiblement égal à l'espace interorbitaire et un peu plus petit que l'espace préorbitaire. Il est compris de 3 fois $1/2$ à 4 fois dans la longueur de la tête.

Dents — Les mâchoires sont de longueur égale. Le maxillaire atteint à peine le bord antérieur de l'orbite. Dents cardiformes antérieurement, plus fortes sur la rangée externe. Molaires latérales sur deux ou trois rangées.

Intérieur de la bouche et de la cavité branchiale : rouge orangé.

Pagellus acarne. Day. British Fishes. Pl. XVI.

Nageoires — Dorsale à douze rayons épineux et 11 rayons mous. Anale à un rayon épineux et 10 mous. Les deux derniers rayons mous de la dorsale et de l'anale sont réunis par une membrane commune. Pectorales falciformes atteignant le troisième rayon de l'anale. Caudale fourchue.

Ligne latérale — Bien marquée, presque droite. 70 à 72 écailles.

Rayons branchiostèges : 6. Dorsale : XII+11. Anale : III+10. Pectorales : 17. Ventrales 1+5. Caudale : 17. Vertèbres : 9+13. Ligne latérale : 70/72. Lignes transverses : 5/13. Coecums pyloriques : 5.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET BIOLOGIE — Méditerranée, assez courant. Côtes de l'Atlantique : des Canaries au Sud-Ouest des Iles Britanniques. Rare ailleurs.

SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE OUVRAGES PRINCIPAUX

1554. — RONDELET, XV. C. 20, p. 151 (*Acarne*).
1810. — RISSO, Ichth. Nice, p. 252 (*Sparus berda*).
1827. — RISSO, Eur. Mérid., III, p. 361 (*Pagrus acarne*).
1829. — CUVIER, Règne Animal (*P. acarne*).
1828-1849. — CUVIER & VALENCIENNES, VI, p. 191 (*Pagellus acarne*).
1829. — CUVIER, Règne Animal. Illustr. Poiss., pl. XXXV (*P. acarne*).
1850. — GUICHENOT, Explor. Scient. Algérie. Poiss., p. 31 (*P. acarne*).
1859. — GUNTHER, Catal. I, p. 480 (*P. acarne*).
1867. — STEINDACHNER, Icht. Span. Portug., p. 60 (*P. acarne*).
1868. — GUICHENOT, Revision Genre Pagel., p. 103 (*P. acarne*).
1870. — CANESTRINI, Fauna Italica, p. 91 (*P. acarne*).
1881. — MOREAU, Pois. France, III, p. 36, ifg. 156 (*P. acarne*).
1884. — DAY, British Fishes. I, p. 39, pl. XVI (*P. acarne*).
1926. — JOUBIN & LE DANOIS, Catal. Pois. Comest. France, p. 113 (*P. acarne*).

J. LE GALL 1931.