


TELEOSTEI

*Sparidae*

## Pagellus erythrinus

(Cuv. Val.)



**DIAGNOSE** — Corpo ovale lateralmente compresso, ricoperto di squame mediocri, leggermente cigliate. L'altezza del tronco sta più di 3,1/2 volte nella lunghezza totale del pesce.

Testa alquanto grande con il profilo superiore arquato, la sua lunghezza sta 3 1/2 volte in quella del corpo. Bocca mediocre, labbra carnose. Mascella superiore più corta dell'inferiore, ambedue provviste anteriormente di minuti denti; posteriormente hannovi 2 serie di denti molari di media grandezza.

Occhio normale, ovale, nei giovani è più sviluppato che negli adulti, il suo diametro sta 3 a 3 1/2 volte nella lunghezza della testa. Linea laterale ben marcata e segue quella del dorso; vi si contano 60 a 65 squame, in quella trasversale 21 a 22.

Preopercolo ben sviluppato, esso possiede varie striature incise. Opercolo alto con il margine inferiore ottuso. Sulle guancie 6 serie di squame, vi sono pure squame sulla regione frontale.

Dorsale lunga con 12 raggi spinosi elastici, essa incomincia sopra l'inserzione della pettorale, i 2 primi sono corti il terzo è il più lungo, tutti sono più alti della porzione molle composta da 10 raggi. Anale con 3 raggi spinosi il 3° il più lungo e, 9 raggi molli. Pettorali falciformi, lunghe raggiungono i primi raggi dell'anale, esse posseggono 15 a 16 raggi. Ventrali hanno principio dietro l'inserzione delle pettorali con un forte aculeo e 5 raggi molli. Codale bene sviluppata, forcuta, ha 17 raggi ed oltre questi 2 di marginali. La sua base è ricoperta da minute squame.

**COLORAZIONE** — La tinta generale è di un bel rosso molto intenso sulla regione dorsale il quale va sbiadendo verso i fianchi fino a diventare bianco argenteo sul ventre. Alcune fascie verticali rossigne si scorgono talvolta sul corpo negli esemplari appena presi. Le pinne sono della medesima tinta del corpo ma però sempre più pallide.

**DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA** — Vive in tutto il Mediterraneo, nonché nell'Oceano Atlantico ove spingesi fino alle coste dell'Inghilterra e dell'Islanda. Lo si trova

pure alle Isole Canarie, Teneriffa, alle Isole del Capo Verde, coste occidentali dell'Africa fino al Capo di Buona Speranza.

#### BIBLIOGRAFIA

1766. — LIN., *Sparus erythrinus*, Syst. nat. I, pag. 469.  
1768. — BRUNN, *Sparus erythrinus*, Icht. Massil., pag. 43.  
1801. — LACEP., *Sparus pagellus*, IV, pag. 86.  
1810. — RISSO, *Sparus erythrinus*, Icht. Nice, pag. 240.  
1826. — RISSO, *Pagrus erythrinus*, Eur. merid., pag. 361.  
1830. — CUV. VAL., *Pagellus erythrinus*, Hist. nat. Poiss. VI, pag. 170.  
1833. — LOWE, *Pagellus rostratus*, Trans. Zool. Soc. II, pag. 177.  
1836. — VALEN., *Pagellus canariensis*, Icht., pag. 33.  
1850. — GUICH., *Pagellus erythrinus*, Expl. Alger, pag. 50.  
1859. — GUNTH, *Pagellus erythrinus*, Cat. I, pag. 473.  
1870. — BOURYOT, *Pagellus erythrinus*, Hist. Paris Marchè Alger, pag. 53.  
1872. — CANEST., *Pagellus erythrinus*, Fauna d'Ital., pag. 90.  
1881. — MOREAU, *Pagellus erythrinus*, Hist. Poiss. Franc., III, pag. 23.  
1912. — NINNI E., *Pagellus erythrinus*, Cat. Pesci Adr., pag. 40.  
1926. — DE BUEN F., *Sparus erythrinus*, Cat. Icht. Medit. Espan., pag. 136.

E. NINNI — 1931.