



EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. *Pagrus pagrus*, LINNÉ. CUVIER & VALENCIENNES, pl. 148, loc. cit.

Fig. 2. Dentition du *Pagrus pagrus*. CUVIER & VALENCIENNES, loc. cit.

DIAGNOSE GÉNÉRIQUE — Sparidae aux mâchoires garnies de dents coniques antérieures (canines) et de molaires latérales. Ces molaires sont sur deux rangées, trois au plus. Joues écailleuses. Douze rayons épineux à la dorsale (rarement moins). Les rayons épineux peuvent s'effacer dans un sillon dorsal. Appendices pyloriques peu nombreux. Vessie natatoire simple.

DIAGNOSE SPÉCIFIQUE — Corps ovale, de 20 à 65 centimètres de long à l'état adulte, couvert d'écailles assez fortes et ciliées. Hauteur du corps comprise 3 fois à 3 fois 3/4 dans la longueur totale.

Coloration : Partie antérieure et sommet de la tête : brun rouge ; dos : rouge doré ; flancs : rose argenté ; nageoires rose chair ; ventre blanc.

Les teintes argentées dominant davantage chez le jeune.

Tête : Profil antérieur fortement convexe, descendant d'une façon abrupte de l'œil à la bouche, surtout chez les individus âgés. Joues et opercules écailleux. Longueur de la tête comprise de 3 fois 3/4 à 4 fois 1/4 dans la longueur totale. Yeux de taille moyenne, leur diamètre est compris de 3 fois 1/4 à 4 fois dans la longueur de la tête, une fois 1/2 à 2 fois dans celle du museau. Espace interorbitaire légèrement convexe et double du diamètre de l'œil. Iris doré.

La mâchoire inférieure est légèrement plus avancée que la mâchoire supérieure, celle-ci atteignant en arrière le diamètre vertical de l'œil.

Dents : Sur chaque mâchoire ; deux ou trois rangées de molaires arrondies avec antérieurement : sur la mâchoire supérieure : plusieurs rangées de petites dents cardiformes, bordées extérieurement par une rangée de dents canines bien plus fortes, les quatre dents antérieures étant les plus développées. Sur la mandibule : deux ou trois grosses canines font également saillie de chaque côté de la mâchoire.

Nageoires : Dorsale de hauteur modérée augmentant jusqu'au tiers antérieur de sa longueur. Douze rayons épineux et dix mous. Anale à trois rayons épineux : le deuxième étant le plus fort, le troisième le plus long. Pectorales allongées, falciformes atteignant la dernière épine de l'anale. Ventrals courtes, n'atteignant pas l'anus. Caudale fourchue.

Rayons branchiostèges : VI. Dorsale : XII + 10. Pectorales : 15. Ventrals : I + 5. Anales : III + 8. Caudale : 17 ou 18. Vertèbres : 24. (9 + 15). Cœcums pyloriques : 5.

Ligne latérale : 55/60. Lignes transverses : 7/17.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET BIOLOGIE — Méditerranée. Côtes atlantiques : du Cap de Bonne-Espérance au golfe de Gascogne. Rare ou exceptionnel en Manche et en Mer du Nord.

Il ne semble pas avoir de différence entre l'espèce européenne ou africaine et l'espèce américaine distribuée de la côte Sud des Etats-Unis à l'Uruguay et l'Argentine.

Poisson des accores du plateau continental, se rapprochant du rivage en été, au moment de la ponte.

SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE OUVRAGES PRINCIPAUX

Sparus pagrus.

1758. — LINNÉ, Syst. Natur. Ed. X, p. 279.
1768. — BRUNNICH, Pisc. Mass., p. 94.
1810. — RISSO, Ichth, Nice, p. 241.
1809. — DE LA ROCHE, Ann. Mus. XIII, p. 317.

Pagrus vulgaris.

1830. — CUVIER & VALENCIENNES, Hist. Nat. Poissons. VI, 142, pl. 148.
1836. — WEBB & BERTHELOT, Hist. Nat. Iles Canaries. Poissons, p. 32.
1845. — GUICHENOT, Exploration Scient. Algérie. Poissons, p. 49.
1859. — GUNTHER, Catalogue, vol. I, p. 465.
1884. — DAY, British Fishes, p. 30, pl. XI.
1837. — STEINDACHNER, Ich. Span. u Portug., p. 53.
1881. — MOREAU, Hist. Nat. Pois. France, III, p. 40.

Sparus argenteus.

1801. — BLOCH & SCHNEIDER, Syst. Ichth, p. 271.

Pagrus argenteus.

1817. — CUVIER, Règne Animal. Ed. I, p. 272.
1879. — GOODE & BEAN, Proc. U. S. Nat. Mus, p. 133.

Pagrus pagrus.

1898. — JORDAN & EVERMANN, Fish. North Amer. II, 1356, pl. 551.
1913. — LE DANOIS, Pois. Manche Occid., p. 68, fig. 102.
1926. — JOUBIN & LE DANOIS, Catal. Pois. Comest. Côtes France, p. 107.

JEAN LE GALL 1931.