


Parapristipoma mediterraneum

(Diagramma mediterraneum) GUICHENOT 1850

TELEOSTEI
Acanthopterygii
Perciformes-Sparidae

Parapristipoma mediterraneum
(*Diagramma mediterraneum*)
GUICHENOT 1850



Parapristipoma mediterraneum (*Diagramma mediterraneum*) GUICHENOT loc. cit.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. — Genre *Parapristipoma* (Bleeker. Archives Néerlandaises. VIII, 1872).

Sparidae avec toutes les dents coniques, absentes sur le vomer et les palatins. Pas de fortes canines ; les prémaxillaires ne sont pas très protractiles. Menton sans sillon central en arrière de la symphyse maxillaire, mais avec des pores. La base des rayons mous de la nageoire dorsale est garnie d'écaillles. Anale courte avec 7 rayons mous. Préopercule finement strié. Branchiospines longues et effilées. Vessie natatoire simple.

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES. — Corps puissant, elliptique. Hauteur 2 fois 1/2 à 3 fois dans longueur totale. Lignes dorsale et ventrale presque droites. Profil antérieur presque vertical, très convexe sur la nuque. Écailles petites. Taille courante : 50 à 70 centimètres.

Coloration. — Gris-brun avec deux ou trois lignes longitudinales peu nettes sur les flancs. Bord des nageoires sombre.

Tête comprise 3 fois 1/2 dans la longueur totale. Museau long et pointu. Suborbitaire et mâchoires sans écaillles. Yeux grands : D = 3 fois 1/2 dans longueur de la tête. Préopercule strié.

Dents disposées par bandes. Celles de la rangée externe de la mâchoire supérieure étant un peu plus fortes.

Nageoires. — *Dorsale*. La partie molle de la dorsale est aussi longue que la portion épineuse. 11 rayons épineux, les 5^e et 6^e les plus longs. Rayons mous couverts d'écaillles à la base.

Anale nettement recouverte d'écaillles. Le 2^e rayon épineux et le 3^e sont les plus longs. Rayons mous allongés. *Pectorales* pointues. *Caudale* peu fourchue.

Ligne latérale : 64-66.
Rayons branchiostèges : VII.
Dorsale : XII + 17. Anale : III + 8 à 10.
Pectorales : 16. Ventrals : 6.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. BIOLOGIE. — Méditerranée, Côtes d'Espagne. Côte Nord-Ouest d'Afrique (le Burro). Cette espèce doit présenter une sténothermie assez caractérisée et se maintenir dans des eaux de température voisine de 20° (18 à 20°) (Monod).

SYNONYMIE, BIBLIOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, OUVRAGES PRINCIPAUX

1850. — GUICHENOT. Expl. Algérie, p. 45, pl. 3. *Diagramma mediterraneum*.
1859. — GUNTHER. Catal. F., p. 321. *Diagramma mediterraneum*.
1881. — STEINDACHNER. Fische Afrika, p. 9. *Diagramma mediterraneum*.
1927. — P. CHABANAUD et Th. MONOD. Poissons de Port-Etienne. *Diagramma mediterraneum*.
1893. — D. S. JORDAN et B. FESLER. Sparoid Fishes America and Europe. Rep. U. S. Commis. Fish. and Fisheries, 1893, pp. 421, 544. *Parapristipoma mediterraneum*.

Jean LE GALL, 1933.